Patirtis žemės ūkyje nuo 1936 m.

Agrimatco

Daržovių sėklų katalogas
2025 - 2026

MŪSŲ PARTNERIAI

Seminis

Seminis yra seniausias prekės ženklas, žinomas nuo 1865 metų. Seminis kompanija daugiausiai dirba su lauko daržovėmis ir daržovėmis, kurios auginamos po priedangomis ar nešildomuose šiltnamiuose. Didžiausias dėmesys ir investicijos yra skiriamos kopūstinėms daržovėms - baltagūžiams kopūstams, brokoliams, žiediniams kopūstams, taip pat morkoms, svogūnams, porams, špinatams, trumpavaisiams agurkams. Seminis nuo 2005 metų priklauso MONSANTO grupei.

https://seminis.co.uk

De Ruiter Seeds

De Ruiter Seeds specializacija yra uždaro grunto daržovės: pomidorai, agurkai, paprika, baklažanai. Visos kompanijos pastangos yra dedamos, kad patenkinti profesionalių augintojų poreikius. Kompanijos išvesti hibridai yra žinomi ir auginami visame pasaulyje. Nuo 2008 metų De Ruiter Seeds priklauso MONSANTO grupei.

http://www.deruiterseeds.com

Sakata

Kompanija įsikūrė Japonijoje 1913 metais. 1990 metais susikūrė padalinys Europoje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas kuriant naujas baltagūžių kopūstų, brokolių, žiedinių kopūstų, pekininių kopūstų, raudonųjų burokėlių, pomidorų, arbūzų veisles ir hibridus. Dabar Sakata yra žinoma ne tik Japonijoje, bet ir daugelyje Europos šalių, Turkijoje, Pietų Afrikoje, Amerikoje, Brazilijoje.

http://www.sakata-vegetables.eu

Vilmorin

Kompanija įkurta 1743 metais Prancūzijoje ir švęsdama 270 metų jubiliejų sukūrė naują prekės ženklą. Didžiausias kompanijos dėmesys yra skiriamas morkų, pomidorų, žiedinių kopūstų, ridikėlių hibridų išvedimui. Per metus Vilmorin išveda 30 naujų hibridų. Vilmorin turi 10 dukterinių įmonių daugiau negu 100 šalių. Vilmorin priklauso Limagrain grupei, kuri yra ketvirta pasaulyje, pagal sėklų gamybą.

http://www.vilmorin.com

T.O.P. Onion sets

Tai šeimos įmonė, kuri parduoda svogūnų galvutes maistui, perdirba svogūnus į aliejų ir traškučius ir parduoda svogūnų sėjinukus. Savo produktus parduoda 60 šalių. Visada stengiasi, kad produkcija būtų geriausios kokybės, todėl pelnė klientų pasitikėjimą.

http://www.toponions.com

Takii Europe B.V.

Takii Seed buvo įkurta 1835 metais Japonijoje. Dabar kompanija žinoma visame pasaulyje, turi savo padalinius Europoje, Brazilijoje, Šiaurės Amerikoje. Pagrindinės kultūros yra kopūstinės daržovės, tai baltagūžiai kopūstai, brokoliai, Pekininiai kopūstai, taip pat pomidorai, svogūnai laiškams, arbūzai.

http://www.takii.eu

SEMO

Tai jauna įmonė, kuri buvo įsteigta 1994 metais Čekijoje. Ši kompanija daugina žinomas visoje Europoje veisles, o taip pat kuria naujas veisles ir hibridus. Pagrindinės kultūros yra daržo žirniai, paprika, pomidorai, lauko agurkai, salotos ir šakniavaisinės daržovės.

https://www.semo.cz/en/

GALLASY SEMENTI

Per 65 intensyvios veiklos metus įmonė toliau auga ir siekia užimti svarbias pozicijas sėklų sektoriuje Italijoje ir užsienyje, bei siūlo daržovių veisles, atitinkančias rinkos poreikius.

https://www.galassisementi.com/

TPC - The Potato Company

TPC – viena sparčiausiai auganti inovatyvi įmonė tarptautinėje sėklinių bulvių rinkoje, kuri buvo įkurta 2004 m. Šios įmonės komandą sudaro labai patyrusių specialistų ir tyrėjų grupė, kuri kuria naujas bulvių veisles, palaiko glaudžius ryšius tiek su klientais, tiek su selekcininkais. TPC įmonė turi atstovus daugiau nei 60 pasaulio šalių, į kurias eksportuoja sėklines bulves.

https://www.tpc.nl/en//tpc

TURINYS

Kopūstinės daržovės 4
- Baltieji gūžiniai kopūstai
- Raudonieji gūžiniai kopūstai
- Smailiagūžiai kopūstai
- Savojiniai kopūstai
- Žiediniai kopūstai
- Brokoliniai kopūstai
- Pekininiai kopūstai
- Kininiai kopūstai
- Ropiniai kopūstai
- Ropės

Svogūninės daržovės 12
- Svogūnai
- Svogūnų sėjinukai
- Česnakai
- Svogūnai laiškams
- Porai

Šakniavaisinės daržovės 16
- Morkos
- Burokėliai
- Ridikėliai
- Salierai

Bulvės 20

Vaisinės daržovės 22
- Agurkai
- Cukinijos
- Patisonai
- Moliūgai
- Melionai
- Arbūzai
- Pomidorai
- Paprikos, saldžiosios paprikos, aitriosios paprikos

Ankštinės daržovės 31
- Žirniai
- Pupelės, Pupos
- Saldieji kukurūzai

Lapinės daržovės 33
- Salotos
- Grąžgarstė
- Špinatai

Prieskoniniai augalai 36
- Krapai, petražolės
- Kalendra
- Bazilikai

Baltieji gūžiniai kopūstai

Ankstyvi ir vasariniai kopūstai šviežiam vartojimui

ELISA F1

Labai ankstyva baltagūžių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė - 55 dienos. Greitai pradeda formuoti kompaktiškas, apvalias, mažu vidiniu kotu, ryškiai žalios spalvos gūžes, kurias galima pradėti kirsti, kai jos sveria 0,5 kg. Vidutinė gūžės masė 0,8 – 1,5 kg. Kopūstai gerai laikosi lauke, netrūkinėja. Labai gero skonio, saldūs. Augalai gana atsparūs bakteriniam puviniui, pakenčia žemas (iki -6 ºC) temperatūras.

NOZOMI F1

Labai ankstyva kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija - 55 dienos. Augalas kompaktiškas, gūžės 0,8-1,8 kg svorio, apvalios, šviesiai žalios spalvos, puikiai laikosi lauke, transportabilios. Atsparūs juodajai kojelei. Kopūstai skirti šviežiam vartojimui.

ORTUS F1

Ankstyva baltagūžių kopūstų hibridinė veislė, labai derlingi. Gūžės apvalios, vidutinio dydžio, 1-1,5 kg svorio, netrūkinėja. Puikiai tinka šviežiam vartojimui.

PANDION F1

Labai ankstyva baltagūžių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė - 60 dienų. Kopūstas kompaktiškas, gūžės apvalios, 0,8 – 1,5 kg svorio, gražios žalios spalvos, transportabilios. Puikiai tinka šviežiam vartojimui. Kopūstai puikiai laikosi lauke, ilgai neskyla.

Nauja!

GEPARD (TCA576) F1

Ankstyva baltagūžių kopūstų hibridinė veislė gegužės – birželio mėn. derliui. Vegetacija 65 dienos. Gūžės masė 1,5 – 2 kg, gūžės vienodo dydžio. Sodinimo atstumai 50x40 cm, tankumas. Augalai atsparūs fuzariozei, karštiems orams, gerai laikosi lauke, netrūkinėja.

MONALISA F1

Ankstyva kopūstų hibridinė veislė vasaros derliui. Vegetacija 70 – 75 dienos. Gūžės masė 1,0 – 1,5 kg, apvalios, tamsesnės žalios spalvos, puikaus skonio. Kopūstai atsparūs fuzariozei, karštiems orams, gerai laikosi lauke, netrūkinėja.

PREDECO F1

Ankstyva hibridinė kopūstų veislė, skirta vasaros derliui. Vegetacija – 75 dienos. Gūžės apvalios, labai tankios, sveria 1,5 – 2,5 kg, netrūkinėja, galima ilgai laikyti lauke. Aukštos kokybės kopūstai birželio – spalio mėnesių derliui. Tinka auginti didesniu tankumu.

VERTEX F1

Ankstyva hibridinė veislė, auginama vasaros derliui, formuoja 2,0 – 3,5 kg gūžes. Vegetacija: 90- 95 dienos. Pasižymi geru atsparumu fuzariozei ir šaknų puviniui. Tinka rauginimui.

MONROO F1

Ankstyva baltagūžių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija 80-100 dienų. Gūžės tamsiai žalios spalvos, 1,5 – 2,5 kg svorio, turi vaškinį sluoksnį, todėl augalą mažiau puola kenkėjai, atsparūs fuzariozei. Labai gerai laikosi lauke, saldūs ir minkšti.

Šviežiam vartojimui ir sandėliavimui

CORONET F1

Vidutinio vėlyvumo kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija 110 – 120 dienų. Gūžės 3,0 – 4,0 kg svorio, apvalios, labai vienodos, šviesiai žalios spalvos, tankios. Augalai turi stiprią šaknų sistemą, todėl geai ištveria karštus ir sausus orus. Kopūstai pakenčia žemesnes temperatūras, gerai laikosi lauke, derlingi. Augalai atsparūs fuzariozei ir vidinei lapų nekrozei. Tinka ilgam sandėliavimui iki gegužės-birželio mėnesio. Galima rauginti.

FIGHTER F1

Vėlyva, skirta sandėliavimui, hibridinė kopūstų veislė. Vegetacija 120 dienų. Augalas stačiais plačiais lapais, šviesiai žalios spalvos. Fighter F1 mėgsta turtingas maisto medžiagomis dirvas. Gūžės sveria 3,0-4,5 kg. Keletą mėnesių pasandėliavus kopūstai tinkami rauginimui.

PRONCA F1

Vidutinio vėlyvumo kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija - 120 dienų. Gūžės apvalios, kietos, trumpu vidiniu kotu, puikaus skonio, gerai laikosi lauke. Galima išauginti 2,0 – 4,0 kg masės gūžes, tačiau pasodinus rečiau jos gali sverti ir 6,0 – 8,0 kg. Atsparūs fuzariozei.

KRONOS F1

Vėlyva, labai derlinga kopūstų hibridinė veislė, skirta perdirbimui ir ilgam sandėliavimui (iki gegužės-birželio mėn.). Vegetacija - 140 dienų. Augalas stiprus, kompaktiškas, gūžės apvalios, 4,0 – 6,0 kg svorio. Augalai atsparūs tripsams.

Kopūstai perdirbimui

ZYKLOP F1

Ankstyva kopūstų hibridinė veislė. Gūžės puikios vidinės struktūros, lapai ploni, vidinis kotas trumpas. Kopūstų gūžės apvalios, 3,0 – 6,0 kg svorio. Augalai atsparūs fuzariozei. Rekomenduojama naudoti rauginimui, nes trumpas fermentacijos laikas.

TOBIA F1

Vasarinė gūžinių kopūstų hibridinė veislė rugpjūčio-rugsėjo mėnesio derliui. Kopūstų vegetacija 85 – 90 dienų. Augalas kompaktiškas, tamsiai žalios spalvos. Gūžės 4,0 – 7,0 kg svorio, vidiniai lapai ilgi, balti ir ploni, gyslos nedidelės, vidinis kotas trumpas, labai gero skonio. Gerai laikosi lauke, netrūkinėja. Atsparus fuzariozės 1 rasei. Puikiai tinka šviežiai produkcijai ir rauginimui, trumpalaikiam sandėliavimui.

RINDA F1

Vidutinio ankstyvumo kopūstų hibridinė veislė, tinkama šviežiam vartojimui, perdirbimui ir rauginimui. Kopūstų vegetacija 90 dienų. Derlius imamas rugpjūčio mėnesį. Gūžės apvalios, sveria 6,0-8,0 kg, trumpa šerdimi, tinkami rauginimui. Puikiai laikosi lauke. Labai derlingas. Atsparūs kopūstų gyslų bakteriozei, juodajam puviniui.

STRUKTA F1

Vidutinio vėlyvumo hibridinė veislė. Vegetacija – 110 dienų. Gūžės sveria 3,0 – 5,0 kg, pasodinus rečiau gali užaugti iki 8,0 – 10,0 kg. Tinka rauginimui. Atsparūs sausroms ir karščiui, gerai laikosi lauke. Gūžės tankios, gero skonio, tamsiai žalios. Tinka šviežiam vartojimui, trumpam sandėliavimui.

AMBROSIA F1

Hibridinė kopūstų veislė, vegetacija 120 dienų. Tai 'Atria' tipo kopūstai skirti rauginimui. Gūžės sveria 6,0 – 8,0 kg, baltos, gero skonio, gerai laikosi lauke, neskyla. Sandėliuojami iki sausio mėn.

ATRIA F1

Vėlyva gūžinių kopūstų hibridinė veislė, skirta vartoti šviežiam vartojimui, rauginimui ir sandėliavimui iki kovo mėn. Vegetacija 140 dienų. Kopūstų gūžės apvaliai plokščios, 6,0 – 8,0 kg svorio, trumpa šerdimi, puikios vidinės struktūros, puikiai laikosi lauke. Augalai atsparūs tripsams ir fuzariozei.

KOLIA F1

Vėlyva gūžinių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija 130-140 dienų. Kopūstų gūžės apvaliai-plokščios, 4,0 – 8,0 kg svorio, trumpa šerdimi. Kopūstai tinkami šviežiam vartojimui, rauginimui ir sandėliavimui iki kovo mėnesio. Kolia F1 hibridas atsparus fuzariozei. Rekomenduojama sodinti 25 – 30000 vnt.sėklų/ha

Baltieji gūžiniai kopūstai

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis)	Gūžės svoris, kg	Sodinimo tankumas, vnt/ha	Panaudojimas	Savybės
Ankstyvi ir vasariniai kopūstai šviežiam vartojimui					
Elisa F1	50-55	0,8-1,5	40 000-60 000	Labai ankstyvam derliui	Auginami atvirame grunte ir po priedangomis
Nozomi F1	55	0,8-1,5	40 000-60 000	Labai ankstyvam derliui	Auginami atvirame grunte ir po priedangomis
Ortus F1	55-60	1,0-1,5	50 000-60 000	Ankstyvam derliui	Gūžės netrūkinėja
Pandion F1	60	0,8-1,5	50 000-60 000	Ankstyvam derliui	Gūžės ilgai netrūkinėja. Augintami po priedangomis ir atvirame grunte
Gepard F1	65	1,5-2,0	50 000	Šviežiam vartojimui, perdirbimui (pjaustymui, marinavimui)	Gūžės netrūkinėja
Monalisa F1	70-75	1,0-1,5	50 000-60 000	Ankstyvam derliui	Atsparui fuzariozei, karštiems orams, gerai laikosi lauke, netrūkinėja
Predeco F1	75	1,5-2,5	50 000-55 000	Vasaros derliui	Gūžės netrūkinėja, galima ilgiau laikyti lauke
Vertex F1	90-95	2,0-3,5	45 000	Šviežiam vartojimui	Atsparūs fuzariozei ir šaknų puviniui
Monroo F1	80-100`	1,6-2,5	50000-55000	Šviežiam vartpjimui	Atsparūs fuzariozei
Šviežiam vartojimui ir sandėliavimui					
Coronet F1	110-120	2,0-4,0	35 000 40 000	Ilgam sandėliavimui	Atsparūs fuzariozei, gerai laikosi lauke
Fighter F1	120-140	3,0-4,5	35 000-40 000	Keletą mėnesių pasandėliavus tinka rauginimui	Mėgsta derlingus dirvožemius, atsparus fuzariozei
Pronca F1	120	2,0-4,0 (6,0-8,0)	40 000	Šviežiam vartojimui, ilgam sandėliavimui	Atsparūs fuzariozei
Ambrosia F1	120	6,0-8,0	25 000-30 000	Skirti rauginimui, sandėliavimui iki sausio mėn.	Gerai laikosi lauke, netrūkinėja
Kronos F1	140	4,0-6,0	30 000-50 000	Sandėliavimui iki gegužės mėn.	Kompaktiškas, atsaprus tripsams
Kopūstai perdirbimui					
Zyklop F1	85-90	3,0-6,0	25 000-35 000	Tinka rauginimui, nes trumpas fermentacijos laikas	Augalai atsparūs fuzariozei
Tobia F1	85-90	4,0-7,0	28 000-35000	Šviežiam vartojimui ir rauginimui	Gerai laikosi lauke, netrūkinėja. Atsparūs fuzariozės 1 rasei
Rinda F1	90	3,0-7,0	25 000-30 000	Šviežiam vartojimui, perdirbimui ir rauginimui	Labai derlingi. Atsparūs kopūstų gyslų bakteriozei, juodajam puviniui
Strukta F1	110	3,0-5,0 (8,0-10,0)	40 000	Trumpam sandėliavimui, rauginimui	Atsparūs sausroms ir karščiui, ilgai laikosi lauke
Atria F1	140	4,0-8,0	25 000-30 000	Šviežiam vartojimui arba rauginimui ir sandėliavimui iki kovo mėn.	Atsparūs tripsams ir fuzariozei
Kolia F1	130-140	4,0-8,0	25 000-30 000	Šviežiam vartojimui arba rauginimui ir sandėliavimui iki kovo mėn.	Atsparūs fuzariozei ir tripsams, puikiai laikosi lauke

Raudonieji gūžiniai kopūstai

Nauja!

PRETINO F1

Labai ankstyva raudonųjų gūžinių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija - 65 dienos. Gūžės gražios ovalios formos. Gūžės užauga iki 1,5 – 2,0 kg, skirtos šviežiam vartojimui.

RED JEWEL F1

Ankstyva raudonųjų gūžinių kopūstų hibridinė veislė, tinkama šviežiam naudojimui ir ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 80-90 d. Gūžės apvalios, tamsiai raudonos spalvos, labai gero skonio, užauga iki 1,5 – 2,0 kg (gali būti didesni, priklausomai nuo auginimo atstumų).

ZELOX F1

Derlinga raudonųjų gūžinių kopūstų hibridinė kopūstų veislė, vegetacija 135 – 140 dienų. Gūžės ovalios formos, 3,0 – 5,0 kg svorio, skanūs. Kopūstai tinka perdirbimui ir ilgam sandėliavimui.

Raudonieji gūžiniai kopūstai

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis)	Gūžės svoris, kg	Sodinimo tankumas, vnt/ ha	Panaudojimas	Savybės
Pretino F1	65	1,5-2,0	50 000	Šviežiam vartojimui	Labai ankstyvi
Red Jewel F1	80-90	1,5-2,0	30 000-55 000	Šviežiam vartojimui ir sandėliavimui	Ankstyvi, auginami vasaros, rudens derliui
Zelox F1	135-140	3,0-5,0	30 000-40 000	Perdirbimui ir ilgam sandėliavimui	Derlingi

Smailiagūžiai kopūstai

CAPE HORN F1

Labai ankstyva smailiagūžių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 55 – 65 dienos. Gūželės 0,8 – 1,4 kg svorio, puikaus skonio, minkštos tekstūros, puikiai tinka salotoms gaminti. Tinka auginti viso sezono metu. Atsparūs šalčiui ir išankstiniam žiedynų susisdarymui. Rekomenduojama sėjos norma 50 000 – 80 000 vnt. sėklų/ha

Savojiniai kopūstai

SAVOY KING F1

Ankstyva savojinių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 85 – 90 dienų. Savojiniai kopūstai tinka šviežiam vartojimui pavasariniam ir rudens derliui. Gūžės vidutinio dydžio, 1,2 – 2,0 kg svorio, pusiau plokščios formos. Kopūstai gerai laikosi lauke.

SAVONARCH F1

Vidutinio vėlyvumo savojinių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 90 – 95 dienos. Tinka rudens-žiemos derliui, šviežiam vartojimui. Gūžės vidutinio dydžio, 1,3 – 2,2 kg svorio, tamsiai žalios, pusiau plokščios formos. Gerai laikosi lauke.

Žiediniai kopūstai

MOMENTUM F1

Labai ankstyva žiedinių kopūstų hibridinė veislė. Vegetacija apie 50 dienų. Žiedynai balti, kokybiški, vienodi, gerai uždengti gaubiamaisiais lapais. Galima sodinti nuo kovo vidurio.

ALSTON F1

Derlinga hibridinė žiedinių kopūstų veislė vasaros sezonui. Vegetacia 65 – 85 dienos. Atsparūs karščiams, tvirtas žiedynas gerai uždengtas šoniniais lapais. Tinkami pakavimui ir perdirbimui dėl savo kupolo formos.

Nauja!

WHITEX F1

Whitex F1 – pirma veislė ryškios, baltos spalvos ir lengvai nuimama iš Curdivex® tipo žiedinių kopūstų asortimento. Vegetacija 65 – 75 d., auginama pagrindiniam vasaros ir rudens derliui. Gerai augantis, stačia lapija augalas, ryškiai baltu žiedynu. Lengva nuimti derlių, nes gerai matomas žiedynas. Galima ilgiau palikti lauke, nes žiedynas išlieka baltas.

FREEDOM F1

Hibridinė žiedinių kopūstų veislė pagrindiniam vasaros ir rudens derliui. Vegetacija 70 – 75 dienos. Stabiliai dera esant skirtingoms augimo sąlygoms. Derlius imamas liepos – spalio mėn.

FORTALEZA F1

Žiedinių kopūstų hibridinė veislė, tinkama auginti viso sezono metu, tačiau labai gerai auga vasarą iki spalio mėn., nes yra atsparesnė karštiems orams. Žiedynai užauga per 72 d. Žiedynai labai balti, sunkūs, vienodi, labai gerai uždengi gaubiamaisiais lapais.

WHITON F1

Žiedinių kopūstų hibridinė veislė vasaros - rudens derliui, vegetacija 75 – 85 dienos, žiedynas puikios išvaizdos - labai baltas. Augalai labai atsparūs karščiams.

KARNEVAL F1

Hibridinė žiedinių kopūstų veislė, tinkama auginti rudens derliui, tačiau galima auginti ir pavasarį. Vegetacija 75-85 dienos. Žiedynai gražios formos, gerai uždengti, kokybiški, balti, gali užaugti iki 1 kg. Derlius imamas liepos-spalio mėn.

Nauja!

GIEWONT F1

Šiaurės ir vakarų Europoje populiari perdirbimui skirta veislė. Vegetacija 85 – 95 d., auginama pagrindiniam rudens derliui. Žiedynas tvirtas, tankus, kokybiškas. Derlinga hibridinė veislė gerai deranti rugsėjo ir spalio mėnesiais.

CONCEPT F1

Išskirtinės išvaizdos, derlinga hibridinė žiedinių kopūsų veislė pavasario, vasaros ir ankstyvo rudens derliui. Žiedynai labai gražūs, aukštos kokybės, tankūs, gero skonio ir aromato. Tai aukštos klasės žiediniai kopūstai, atitinkantys prekybos centrų reikalavimus. Vegetacija 85 – 90 dienų. Gerai prisitaiko prie nepalankių augimo sąlygų. Derlius imamas birželio – rugsėjo mėn.

MERTON F1

Hibridinė žiedinių kopūstų veislė, vegetacijos trukmė 85 – 95 dienos. Labai stiprus augalas, turintis galingą šaknų sistemą. Puikiai prisitaiko augti skirtingomis augimo sąlygomis. Statūs ir dideli lapai puikiai uždengia baltus, tankius ir sunkius žiedynus. Tinka auginti įvairių tipų dirvožemiuose.

KASTOR F1

Hibridinė žiedinių kopūstų veislė - auginama rudens derliui. Vegetacijos trukmė 80 – 95 dienos. Žiedynai labai vienodi, dideli, gerai uždengti, lapai stiprūs. Derlių galima nuimti per 3 – 4 kartus rugpjūčio - spalio mėn. Naudojami šviežiai produkcijai ir perdirbimui. Tinka auginti vėsesnio klimato sąlygomis ir turtingose maisto medžiagomis dirvose.

Žiediniai kopūstai

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis) Pavasarį/Vasarą/Rudenį	Sodinimo tankumas, vnt/ha	Derlius	Savybės
Momentum F1	50 / - / -	30 000 – 35 000	Gegužė - birželis	Labai ankstyvi, žiedynai balti, vienodi
Alston F1	65-85	30 000 – 35 000	Gegužė - rugsėjis	Tvirtas žiedynas, gerai uždengtas šoniniais lapais
Whitex F1	65-75	30 000 – 35 000	Birželis-rugsėjis	Labai baltas, tvirtas žiedynas
Freedom F1	89/69/79	30 000 – 35 000	Liepa - spalis	Baltesnis už Fremont, stabiliai dera esant skirtingoms augimo sąlygoms
Fortaleza F1	72 / - / -	30 000 – 35 000	Liepa - spalis	Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui
Whiton F1	75 – 85	30 000 – 35 000	Birželis - rugsėjis	Labai atsparūs karščiams
Karneval F1	70-85	30 000 – 35000	Liepa - rugsėjis	Ttinka auginti rudens derliui, tačiau galima auginti ir pavasarį
Giewont F1	85-95	30 000 – 35000	Rugsėjis-lapkritis	Žiedynas tvirtas, tankus, kokybiškas
Concept F1	80/75/80	30 000 – 35 000	Birželis - rugsėjis	Pakantūs nepalankioms augimo sąlygoms
Merton F1	**85-95**	**30 000 – 35 000**	**Rugpjūtis - rugsėjis**	**Puikiai prisitaiko augti skirtingomis augimo sąlygomis**
Kastor F1	**-/75/90-100**	**30 000 – 35 000**	**Rugsėjis - spalis**	**Žiedynai labai vienodi, gerai uždengti**

Brokoliniai kopūstai

AQUILES F1

Labai ankstyva hibridinė veislė, vegetacija 65-70 dienų. Tinka sėti anksti pavasarį. Augalas kompaktiškas, žiedynai vienodi, lygūs, kupolo formos, 350-500 g svorio. Jis taip pat tinka mažų "mini" žiedynų auginimui, tik reikia sodinti tankiau. Kartais ankstyvos sėjos brokoliai nelaiku sužydi, o 'Aquiles F1 tam gana atsparus. Šis hibridas gerai auga derlinguose dirvožemiuose, kur yra pakankamai drėgmės ir azoto.

IRONMAN F1

Greitai auganti, labai derlinga hibridinė brokolių veislė, tinkama auginti visą sezoną. Brokolio žiedynai kupolo formos, puikios kokybės, lengvai kertami. Žiedynai subręsta vienu laiku, todėl derliaus nuėmimo periodas gana trumpas. Sunkiausi žiedynai užauga vasarą. Vegetacija: pavasarį/ vasarą/ rudenį: 83/64/77 dienos

NAXOS F1

Hibridinė veislė, skirta vasaros derliui. Vegetacija 75-80 dienų. Žiedynai 400-600 g svorio, tamsiai žali, kupolo formos. Natūraliai stiprus augalas, labai greitai reaguoja patręštas azoto trąšomis. Gerai auga ir vidutinę, ir karštą vasarą. Naxos F1 tinka auginti ir ekologiniuose ūkiuose. Nerekomenduojama ankstyvai sėjai, daigai persodinami nuo 05.15 iki 06.15 .

PARTHENON F1

Vėlyva brokolių hibridinė veislė. Vegetacija - 85 dienos. Sodinimas nuo gegužės iki liepos mėn. Brokolių žiedynai kupoliški 400-600 g svorio. Turi stiprią šaknų sistemą, puikiai auga tiek sausomis, tiek ir drėgnomis sąlygomis, vidutiniškai reiklus azoto trąšoms. Brokoliai turi mažiau šoninių atžalų, yra atsparūs stiebo tuštėjimui, rausvėjimui ir stresams. Puikiai laikosi nukirsti. Naudojami šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Vegetacija: vasarą/ rudenį - 80/85 dienų.

MARATHON F1

Hibridinė veislė, rinkoje laikoma kaip standartas. Marathon F1 yra įtrauktas į auginimo programas, nes labai gerai prisitaiko prie augimo sąlygų. Gali būti auginami viso sezono metu. Brokolių vegetacija 75 – 80 dienų. Derlius nuimamas birželio – spalio mėnesį. Žiedynai užauga iki 350 – 500 g.

CHRONOS F1

Hibridinės brokolių veislės vegetacija 65 – 70 dienų, šiek tiek ankstyvesnė nei Parthenon. Augalas kompaktiškas, žiedynas mėlynai žalios spalvos, sveria 400 – 600 g. Rekomenduojamas vasaros pabaigos – rudens derliui.

MYKONOS F1

Derlinga hibridinė brokolių veislė, skirta vasaros derliui, panašūs į Naxos F1. Žiedynai tamsiai žali, gražios formos, kokybiškas. Vegetacija 75 dienos. Myconos F1 puikiai tinka auginti pavasario ir vasaros derliui.

Brokoliniai kopūstai

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis) Pavasarį/Vasarą/Rudenį	Sodinimo norma, vnt/ha	Derlius	Savybės
Aquiles F1	65 /- /70	40 000 – 45 000	Birželis - liepa	Ypač ankstyvam derliui
Ironman F1	83/64/77	40 000 – 45 000	Birželis - rugsėjis	Puiki kokybė, derlinga
Naxos F1	75-80	30 000 – 40 000	Liepa - spalis	Nerekomenduojama ankstyva sėja
Parthenon F1	-/80/85	30 000 – 40 000	Liepa - spalis	Turi stiprią šaknų sistemą, puikiai auga sausomis, tiek drėgnomis sąlygomis
Marathon F1	75-80	30000 – 40000	Liepa - spalis	Labai gerai prisitaiko prie augimo sąlygų
Chronos F1	65-70	30000 – 40000	Liepa - spalis	Rekomenduojamas vasaros pabaigos – rudens derliui
Mykonos F1	75	40 000 – 45 000	Birželis - liepa	Puikiai tinka auginti pavasario ir vasaros derliui

Pekininiai kopūstai

KISEKI F1

Pekininių kopūstų hibridinės veislės vegetacija 63-68 dienos. Gūžė sveria 1,2 – 1,8 kg. Išoriniai lapai tamsiai žali, o vidus geltonas. Išėmus iš saugyklos ir nuvalius išlieka gražios žalios spalvos. Atsparūs šalčiams, lapų galiukų parudavimui, pakenčia karščius. Mažiau jautrūs juodų taškelių atsiradimui ant lapų. Tinka auginti rudens derliui.

ENDURO F1

Pekininių kopūstų vegetacija 65 dienos. Tinka auginti vasaros-rudens derliui. Gūžės cilindrinės, sunkios, 1,0 – 1,5 kg svorio. Išėmus iš saugyklos lengva nuvalyti ir nuvalius lieka gražiai žali. Šviežiai rinkai, perdirbimui ir ilgam sandėliavimui. Atsparus lapų kraštelių parudavimui ir juodų smulkių taškiukų atsiradimui. Rekomenduojamas sodinimo tankumas 65 000 vnt./ha.

RICHI F1

Vidutinio vėlyvumo pekininių kopūstų hibridinė veislė šviežiam vartojimui, perdirbimui ir ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 65 – 75 dienos. Augalai ryškiai žalios spalvos su geltonu vidumi, (Barell tipo) statinaitės formos, gūžės gana didelės, 2,0 – 2,5 kg svorio. Gerai susisukę, tankios. Tinka auginti vasaros ir rudens derliui. Dera vienu metu. Atsparus sužydėjimui. Rekomenduojamas sodinimo tankumas 35 000 – 45 000 vnt./ha

YUKI F1

Populiariausia įmonės SAKATA pekininių kopūstų hibridinė veislė. Augalas vidutinio dydžio, kompaktiškas, statinaitės formos, 1,5 – 2,5 kg. Tinka sėti pavasario ir rudens derliui, perdirbimui ir ilgam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 65 – 70 dienų. Atsparus lapų galiukų patamsėjimui. Rekomenduojamas sodinimo tankumas 35 000 – 40 000 vnt./ha

Kininiai kopūstai

JOI CHOI F1

Ankstyva hibridinė veislė, vegetacijos trukmė 35 – 50 dienų. Lapai tamsiai žalios spalvos, lapkotis baltas. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke, galima pradėti imti derlių, kai užauga iki 250 g arba auginti didesnius (iki 450 g). Nelinkę leisti žiedynų, todėl mažesnė rizika auginant, jei pasikeičia auginimo sąlygos. Rekomenduojama sėjos norma 0,75 – 1,2 mln. sėklų/ha.

MEI QING CHOI F1

Hibridinė kininių kopūstų veislė, tinka auginti vasaros ir rudens derliui, tačiau susidarius nepalankioms augimo sąlygoms, gali pradėti formuoti žiedyną. Augalas status, kompaktiškas, 70 – 250 g, šviesiai žaliu lapkočiu. Vegetacija: 30 – 40 dienų

YANG QING CHOI F1

Vidutinio ankstyvumo hibridinė kininių kopūstų veislė, tinka auginti viso sezono metu. Augalas status, kompaktiškas, tamsiai žalios spalvos lapais ir šviesiai žalios spalvos lapkočiais, 70 – 250 g svorio. Labai gerai išsilaiko lauke. Nelinkę leisti žiedynų, todėl yra mažiau rizikos, kai pasikeičia augimo sąlygos.

YOU QING CHOI F1

Hibridinė kininių kopūstų veislė, tamsiai žaliais lapais, šviesiai žaliais lapkočiais, 70 – 250 g svorio, vidutiniškai ankstyva. Augalas aukštas, tiesus, labai sultingas ir skanus. Tinka auginti vasaros ir rudens derliui. Vegetacija: 40 – 45 dienos

Ropiniai kopūstai

SPARTA F1

Vidutinio ankstyvumo ropinių kopūstų veislė. Stiebagumbiai balti, 150 – 200 g masės. Vegetacija 65 – 70 dienų. Tinka auginti pavasarį - vasarą lauke sėjant tiesiai į dirvą. Stiebagumbiai atsparūs trūkinėjimui.

AZUR

Vidutinio ankstyvumo ropinių kopūstų veislė auginimui lauke. Stiebagumbių spalva - violetinė, skanūs, saldūs, sveria 150 – 200 g. Vegetacija 65 – 70 dienų. Galima sėti tiesiai į dirvą nuo gegužės mėn.

Nauja!

GIGANT

Vėlyvoji baltųjų ropinių kopūstų veislė su labai dideliais stiebagumbiais (užauga iki 3 – 5 kg), kuriuos galima ilgai sandėliuoti. Vegetacija – 110 d. Minkštimas atsparus trūkinėjimui ir sumedėjimui.

QUICKSTAR F1

Labai ankstyva ir populiari hibridinė ropinių kopūstų veislė, tinkanti auginti šiltnamiuose. Stiebagumbis vidutiniškai žalias, šiek tiek paplokščias, masė apie 150 g. Ilgai nesužydi.

Ropės

SWEETBELL F1

Apvalios, gražios formos, baltai violetinės spalvos šakniavaisiais ropės. Vegetacija 70-85 dienos. Lapai žali, stiebai violetinio atspalvio, tinkamos rudens derliui. Labai skanios, ypač saldžios, geros prekinės išvaizdos. Šakniavaisio skersmuo 6-8 cm. Sėjos norma 1 mln. sėklų/ha

Svogūnai

BARITO F1 — Seminis

Labai ankstyva, derlinga hibridinė veislė, vegetacijos periodas - 95 dienos. Turi gerą šaknų sistemą, todėl gerai dera net ir esant nepalankioms sąlygoms. Anksti formuojasi ropelė, todėl galima tiekti ankstyvajam perdirbimui. Ropelės apvalios, lukštas gelsvai rudos spalvos. Sandėliuojasi iki sausio mėnesio, tačiau esant gerai derliaus kokybei galima išlaikyti iki kovo mėn.

Nauja! **BOSSITO F1** — Seminis

Pagrindiniai vėlyvieji Rijnsburger tipo svogūnai. Vegetacija - 100 dienų. Didelis derlingumo potencialas ir ypač ilgas sandėliavimo periodas dėl labai tvirtų lukštų ir puikios tolerancijos atžėlimui.

Nauja! **BRUCE F1** — TAKII SEED

Vidutinio ankstyvumo hibridinė svogūnų veislė, skirta ilgam sandėliavimui, turi daug sausųjų medžiagų. Augalas tamsiai žaliais, stačiais laiškais, atsparus sužydėjimui. Svogūnai apvalūs, patrauklios bronzinės spalvos, skersmuo 60-80 mm. Dėl stipraus ankstyvo augimo ir vidutinio ankstyvumo derlius didesnis nei vidutinis.

Nauja! **RUBY STAR F1** — TAKII SEED

Ankstyva raudonųjų svogūnų hibridinė veislė, skirta ilgam sandėliavimui Šiaurės Europoje. Augalai stipriai auga sezono pradžioje, o svogūnėliai greitai pradeda formuotis po ilgiausios dienos. Dėl ropelių vienodumo ir plono kaklelio užaugina gerą grynąjį derlių. Po derliaus nuėmimo vidinė svogūno spalva yra graži.

KARMEN — semo

Vidutinio ankstyvumo veislė. Vegetacija apie 100-105 dienas. Laiškai statūs. Turi stiprią šaknų sistemą. Ropelės apvalios, 50-70 mm dydžio, tamsiai raudonos spalvos, lukštas kokybiškas. Ropelės švelnaus skonio. Tinka sandėliuoti.

Nauja! **WELLINA** — semo

Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo ilgos dienos svogūnai. Plonu kakleliu, patrauklios apvalios formos, geltonais lukštais svogūnai. Didelis atsparumas sužydėjimui. Tinkami ilgam sandėliavimui.

STUTTGARTER RIESEN — semo

Vidutinio vėlyvumo, pusiau aštrių svogūnų veislė. Vegetacija - 120 dienų. Svogūnų ropelės plokščiai apvalios, geltonu lukštu. Geriausiai sandėliuojasi iki sausio mėnesio, vėliau pradeda želti. Labai tinka svogūnų laiškų auginimui.

Nauja! **KLARIA** — semo

Labai derlinga, ilgos dienos Amerikietiško x Rijnsburger tipo svogūnų veislė. Dėl stiprios šaknų sistemos augalai labai atsparūs aplinkos poveikiui. Lapai yra labai statūs su storesniu vaškiniu sluoksniu, todėl jie yra labai atsparūs mitligei. Svogūnai ilgai sandėliuojasi.

Nauja! **DAGMAR** — semo

Derlinga veislė, skirta trumpam ir vidutiniam sandėliavimui. Svogūnai yra dideli, apvalūs, turi patrauklų bronzinį lukštą. Augalai turi tvirtą šaknų sistemą, todėl tinka auginti esant sausroms bei auštoms temperatūroms. Svogūnėliai tinka lupimui.

Nauja! **WINTERIA** — semo

Vidutinio ankstyvumo žiemojantys svogūnai, kurių derlius stabilus ir stresinėmis sąlygomis. Svogūnėliai vienodo dydžio, gražios gaublio formos, su tvirtais geltonais lukštais, vidutinė masė – 115 g. WINTERIA – atsparūs žiemos šalčiams ir žieduoliškumui. Sandėliavimo laikotarpis – vidutinis.

Svogūnų sėjinukai

Nauja! **CRUSADO F1** — TOP ONIONS

Nauja, labai ankstyva hibridinė veislė. Svogūnai apvalūs, geltonos spalvos. Veislės savybės: derlinga, stipri šaknų sistema, todėl tinkama sandėliavimui. Kolkas tai geriausius rezultatus parodžiusi svogūnų veislė Top Onion asortimente.

CONTADO F1 — TOP ONIONS

Labai ankstyva svogūnų hibridinė veislė. Ropelės apvalios, geltonos / bronzos spalvos su labai tvirtais lukštais, plonu kakleliu, dėl to laiškai greitai nudžiūsta. Derlinga veislė, svogūnai labai tvirti, tinka trumpam sandėliavimui.

CORRADO F1 — TOP ONIONS

Vidutinio ankstyvumo veislė. Laiškai statūs. Ropelės yra geltonai auksinės spalvos, apvalios, didelės, geros prekinės išvaizdos, gerai sandėliuojasi. Lukštai labai tvirti. Didelis derliaus potencialas. Ši hibridinė veislė pradėta dauginti nuo 2009 metų, gerai įvertinti gamybiniuose bandymuose, todėl greitai tapo populiari ir mėgstama pirkėjų. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose.

SETTON — TOP ONIONS

Vidutinio ankstyvumo svogūnų veislė, subręsta anksčiau už Sturon. Jų ropelės iš sėjinukų užauga per 74-86 dienas, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. Ropelės vidutinio didumo, apie 60-80 mm, apvalios, šviesiai rudos-bronzinės spalvos, su gerai prigludusiais lukštais, geros prekinės išvaizdos, švelnaus skonio. Laiškai stambūs, vešlūs. Svogūnai išsilaiko per žiemą. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose.

STURON — TOP ONIONS

Vidutinio ankstyvumo veislė, turinti dvi teigiamas savybes: augalai atsparūs miltligei, o ropelės gerai laikosi žiemą. Ropelės vidutinio dydžio, apie 50-70 mm, apvalios, lukštai bronzinio atspalvio, tvirti. Augalai turi stiprias šaknis. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose.

STUTTGARTER RIESEN — TOP ONIONS

Vidutinio vėlyvumo veislė. Svogūnų ropelės plokščiai apvalios, geltonu lukštu, 45-75 mm dyžio, lukštai tvirti, skonis - pusiau aštrūs. Turi stiprią šaknų sistemą. Geriausiai sandėliuojasi iki sausio mėnesio, vėliau pradeda želti. Labai tinka svogūnų laiškų auginimui.

RED BARON — TOP ONIONS

Derlinga, vidutinio vėlyvumo veislė. Ropelės plokščiai apvalios, tvirto lukšto, pusiau aštraus skonio, pakankamai stambios – 85-100 g svorio. Subrendusių svogūnų lukštai labai gražūs, tamsiai raudoni, vidus – šviesiai violetinis, laiškai sultingi, rausvi. Subrendę svogūnai laikosi iki 5-6 mėn.

SNOWBALL — TOP ONIONS

Ankstyva veislė. Ropelės yra apvalios-apvaliai plokščios, 40-60 mm dydžio, turi ploną kaklelį, lukštas baltas, kokybiškas. Laiškai statūs. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose, tačiau geriausi yra smėlio, priesmėlio lengvi dirvožemiai. Turi gerą šaknų sistemą. NETINKAMI sandėliavimui.

Nauja!

SHAKESPEARE žiemojantys svogūnai

Ankstyva, žiemojančių svogūnų veislė. Shakespeare auginama ankstyvajam derliui, sandėliuojasi iki naujų metų ir ilgiau. Derlius nuimamas birželio pabaigoje–liepos pradžioje. Svogūnai labai skanūs, laiškai traškūs, tamsiai žali. Ropelės apvalios formos, plonu kakleliu, tvirtais gelsvai rudos spalvos lukštais. Svogūnų minkštimas baltas, sultingas ir ganėtinai aštrus.

Česnakai

Nauja!

Žieminiai česnakai GERMIDOUR

Gerai žinoma sertifikuota česnakų veislė iš Prancūzijos. Germidour turi minkštą kaklelį, neformuoja žiedstiebio. Kiekviename svogūne (ropelėje) yra apie 8–12 violetinės spalvos skiltelių, kurios sodinamos rudenį. Germidour užaugina svogūnus (ropeles) gražius, vienodus apvalius, baltai violetinės spalvos stipriu lukštu svogūnus. Šios veislės česnakai gerai auga bet kokio tipo dirvožemyje ir tinkami trumpalaikiam sandėliavimui.

Svogūnai laiškams

GERDA

Labai ankstyva, puikaus skonio, su tamsiai žalia lapija veislė. Vegetacija 70 dienų. Tinka auginti pavasario, vasaros, rudens derliui atvirame grunte ir šiltnamiuose žiemos metu, ypač ankstyvam pavasario derliui. Augalai atsparūs žemai ir aukštai temperatūrai. Laiškai statūs, stipriai augantys, geros kokybės, tamsiai žalios spalvos, švelnaus skonio. Baltosios dalies ilgis 8-10 cm, ropelių neformuoja. Lietuvoje nežiemoja (Vidužemio jūros ir panašaus, švelnaus klimato regionuose labai gerai išgyvena žiemą).

KAJ

Vidutinio ankstyvumo, stačiais lapais veislė. Vegetacija 80 d. Svogūnai skirti auginti laiškams pavasario, vasaros ir ankstyvo rudens derliui po priedangomis, atvirame grunte ir stikliniuose šiltnamiuose, labai tinka auginti pavasario-rudens derliui. Laiškai ilgi (gali augti iki 70 cm), geros kokybės, tamsiai žalios spalvos, baltos dalies ilgis 10-12 cm. Laiškai tiesūs, sveiki, atsparūs grybinėms ligoms ir nepalankioms klimato sąlygoms. Atsparūs kekeriniam puviniui. Rekomenduojama sėti 6-8 mln.sėklų/ha. Lietuvoje nežiemoja (Vidužemio jūros ir panašaus, švelnaus klimato regionuose labai gerai išgyvena žiemą).

Nauja!

KATANA F1

Laiškai tamsiai žali, statūs, kokybiški, baltoji dalis nedidelė, greitai auga. Vegetacija 65-68 d. Augalai pakenčia šalčius, laiškai turi gerą prekinę išvaizdą.

Nauja!

YODA F1

Derlinga komercinė veislė, laiškai tamsiai žalios spalvos, greitai auganti, vegetacija 65-69 d. Svogūnus lengava nuvalyti, didelis derliaus potencialas

Veislės pavadinimas	Sėjos norma kg/ha mln. sėklų/ha	Vegetacija (dienomis)	Sandėliavimas (mėnesiais)	Savybės
Svogūnai				
Barito F1	3-4 (0,75-1,00)	95	3-4	Labai ankstyvi, derlingi, didelės ropelės
Bossito F1	3-4 (0,75-1,00)	100	8-9	Labai derlingas, tinka ypač ilgam sandėliavimui
Bruce F1	3-4 (0,75-1,00)	125	7-8	Vidutinio ankstyvumo hibridinė svogūnų veislė, skirta ilgam sandėliavimui
Rubby Star F1	3-4 (0,75-1,00)	110-120	7-8	Ankstyva raudonųjų svogūnų hibridinė veislė, skirtas ilgam sandėliavimui
Karmen	3-4 (0,75-1,00)	100-105	7-8	Tinka auginti smėlio/molio dirvožemiuose
Wellina F1	3-4 (0,75-1,00)	110-120	7-8	Tinka ilgam sandėliavimui
Stuttgarten Riesen	3-4 (0,75-1,00)	125	7-8	Labai gerai tinka laiškų atželdinimui
Klaria	3-4 (0,75-1,00)	126	7-8	Amerikietiško-Rijsburger tipo, ilgam sandėliavimui
Dagmar	3-4 (0,75-1,00)	125	5-6	Vidut.ankstyvumo, atsparūs sausrom
Winteria	5-6 (1,25-1,50)	Vid.ankstyvumo	3-4	Žiemojantys svogūnai
Svogūnai laiškams				
Gerda	20 kg/ha	65-70	-	Kokybiški laiškai
Kaj	2-3 mln./ha	70	-	Tinkami auginti atvirame grunte ir po priedangomis
Katana F1	2-3 mln./ha	65-68	-	Tamsiai žali laiškai, greitai auga
Yoda F1	2-3 mln./ha	65-69	-	Ankstyva, labai derlinga, hibridinė veislė
Totem F1	2-3 mln./ha	65-70	-	Labai gera kokybė, derlingas

Porai

VOLTA F1

Ankstyva, derlinga hibridinė veislė, vegetacija apie 90 dienų. Baltoji dalis 26-32 cm. Galima sodinti daigais ankstyvam derliui arba vėliau sėti tiesiai į dirvą. Rekomenduojama auginti 17 augalų ilginiam metre. Sėjami kovo mėnesį, daigai sodinami balandžio mėnesį. Ilgai laikosi lauke, puiki prekinė išvaizda. Derlių lengva nuimti ir valyti.

COPERNICUS F1

Vidutinio vėlyvumo derlinga hibridinė veislė, auginama rudens derliui. Galima sodinti daigais arba sėti tiesiai į dirvą. Lapai statūs, tamsiai žali. Baltoji dalis ilga, kokybiška ir sunki. Lengva nuimti derlių ir valyti.

Nauja!

VARNA STAR F1

Ankstyva hibridinė vasarinių porų veislė, tinkama puikiai tinka fasavimui ir perdirbimui. Baltoji dalis ilga, todėl lengviau nuimti derlių ir supakuoti. Galima sėti tiesiai į dirvą.

Nauja!

BYSTRIN F1

Porai su ilga baltąja dalimi, skirta auginti liepos mėn. derliui, taip pat tinka auginti lauke po agrodanga. Porus galima ilgi išlaikyti lauke, augalai aukšti su šviesiai žalia ir labai stačia lapija, baltosios dalies ilgis 45/3 cm. Augalai yra atsparūs aukštai temperatūrai ir išgulimui. Vegetacija – 75 d. (nuo pasodinimo iki derliaus nuėmimo).

Agrimatco

Morkos

PRESTO F1

Vilmorin

Labai ankstyva Nanto tipo hibridinė veislė. Užauga per 85 dienas nuo sudygimo. Šakniavaisio ilgis 18-20 cm, labai vienodos, gražios spalvos. Tinka šviežiam vartojimui.

SPEEDO F1

Vilmorin

Labai ankstyva hibridinė morkų veislė, atspari sužydėjimui. Vegetacija - 90 dienų. Šakniavaisiai cilindriški, vienodo dydžio, 17-19 cm ilgio, formuoja mažas šaknis, todėl užtikrinamas derliaus nuėmimas.

CARVEJO F1

Seminis grow forward

Ankstyva Nanto tipo hibridinė veislė. Vegetacija 85-90 dienų. Šakniavaisiai cilindriniai, labai lygūs, vienodi, apie 18 cm ilgio, 32 mm skersmens, tvirti, nelūžta, todėl tinka plauti. Gero skonio. Lapija stipri, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Didelis prekinis derlius.

Nauja!

CARRUBA F1

Seminis grow forward

Nanto tipo hibridinė veisė. Vegetacija 90-95 d. Morkos skirtos ankstyvam derliui ir trumpam sandėliavimui. Labai derlinga. Šakniavaisiai gražūs, lygūs, nelūžta. Augalai turi stiprią lapiją, todėl lengviau nuimti derlių, nei kitų ankstyvų veislių.

BOLERO F1

Vilmorin

Aukštos kokybės Nanto tipo hibridinė veislė. Vegetacija 110-120 dienų. Šakniavaisio ilgis 18–22 cm, puikaus skonio, sultingi. Lapai labai stiprūs, yra vienodame aukštyje, todėl tinka derlių nuimti mechaniniu būdu. Augalai atsparūs daugumai lapų ir šakniavaisių ligų (ypač alternariozei ir miltligei). Šakniavaisiai tinkami plovimui ir ilgam sandėliavimui.

Nauja!

CARIBOU F1

Seminis grow forward

Labai derlinga Nanto tipo hibridinė morkų veislė pagrindiniam sezonui. Vegetacija 120 dienų. Lapija tamsi, labai stipri. Morkos užaugina stiprius, cilindrinius šakniavaisius, kurie yra skirti ilgam sandėliavimui.

MAESTRO F1

Vilmorin

Nanto tipo hibridinė veislė. Vegetacija 120-130 d. Šakniavaisiai 18–20 cm ilgio, vienodi, puikiai laikosi nuimti, kadangi išlaiko ryškią spalvą. Šakniavaisių odelė labai lygi, gražios išorinės ir vidinės spalvos. Stiprūs, tamsiai žali, statūs lapai leidžia lengvai nuimti derlių mechaniniu būdu. Atspari trūkinėjimui ir lūžinėjimui. Tinka auginti šviežiam vartojimui, plauti ir ilgai sandėliuoti. Atspari alternariozei, miltligei ir bakteriozei (Xanthomonas campestris). Morkos labai saldžios, tinka sulčių gamybai.

VOLCANO F1

Vilmorin

Vėlyva Nanto tipo hibridinė veislė. Vegetacija 130-140 dienų. Šakniavaisiai 18-22 cm ilgio, labai lygūs, gražios spalvos. Nuplautos morkos ilgai išlieka prekinės išvaizdos, nepabąla. Šakniavaisiai atsparūs lūžinėjimui. Nebijo trumpalaikių šalnų. Atsparios alternariozei ir vidutiniškai atsparios miltligei.

SOPRANO F1

Vilmorin

Nanto tipo hibridinė veislė. Vegetacija 120 – 130 d. Šakniavaisiai cilindriniai, labai gražiai užapvalinti, puikios kokybės, tinka sulčių gamybai. Intensyvios oranžinės spalvos tiek vidus, tiek išorė. Šakniavaisis lapai labai lygus, kaip Maestro F1. Puikios išvaizdos. Lapija tamsiai žalia, ilgam sandėliavimui. Atspari alternariozei ir miltligei.

Nauja!

GLADIUS F1

TAKII SEED

Šakniavaisiai atsparūs trūkinėjimui, odelė lygi, puiki vidinė ir išorinė spalva, todėl idealiai tinka šviežiam vartojimui Šakniavaisio ilgis 18-22 cm, skersmuo 3-4 cm. Augalai atsparūs sužydėjimui. Stipri ir sveika lapija. Veislė atspari alternariozei ir lapų dėmėtligei.

Morkos

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis)	Sėjos norma, mln. Vnt. /ha	Šakniavaisio ilgis cm	Tipas	Paskirtis	Savybės
Presto F1	85	0,8-1,4	16-18 cm	Nanto	šviežiai produkcijai ir perdirbimui	Derlinga, galima nuimti mechanizuotai
Speedo F1	90-100	0,8-1,4	20-22 cm	Nanto	šviežiam vartojimui	Ankstyva, vidut.atsparumas amarams
Carvejo F1	85-90	0,8-1,4	18-20 cm	Nanto	šviežiai produkcijai	Labai ankstyva, derlinga
Carruba F1	90-100	1,0-1,4	18-19 cm	Nanto	ankstyvam vartojimui	Stipri šaknų sistema, atspari sužydėjimui
Bolero F1	110-120	1,0-1,4	18-22 cm	Nanto	šviežiai produkcijai, perdirbimui, sulčių gamybai ir ilgam sandėliavimui	Stipri dygimo energija, galima derlių nuimti mechanizuotai, atspari alternariozei, tinka auginti ekologiniuose ūkiuose
Caribou F1	120	1,0-1,4	19-21 cm	Nanto	ilgam sandėliavimui	Laba derlinga, turi stiprią šaknų sistemą.
Maestro F1	120	1,0-1,4	18-22 cm	Nanto	šviežiai produkcijai, perdirbimui, sulčių gamybai, ir ilgam sandėliavimui	Puiki šakniavaisių kokybė ir skonis, atspari alternariozei
Volcano F1	130	1,0-1,4	18-22 cm	Nanto	šviežiai produkcijai, perdirbimui, sulčių gamybai, ir ilgam sandėliavimui	Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui, šakniavaisiai atsparūs lūžinėjimui
Soprano F1	120-130	1,0-1,4	19-21 cm	Nanto	pagrindiniam derliui, sulčių gamybai	Atspari alternariozei ir miltligei.
Gladius F1	120	1,0-1,4	18-22 cm	Nanto	Šviežiai produkcijai ir ilgam sandėliavimui	Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui

Burokėliai

Nauja!

AURORA F1

SAKATA PASSION in Seed

Hibridinė raudonųjų burokėlių veislė atspari Rhizomania and Rhizoctonia. Apvalios formos šakniavaisiai, puikiai tinkami perdirbimui ir sandėliavimui. Šakniavaisiai turi aukštą cukrų kiekį 12-14% Brix. Atsparumas ligoms: IR: BNYVV/ Rs

RED HAWK F1

SAKATA PASSION in Seed

Ankstyva hibridinė veislė, vegetacija 75-85 d. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele, tamsiai raudoni. Turi daug cukraus, todėl tinka mažų burokėlių, vadinamų „baby“ auginimui. Augalo lapija stati ir stipri, mažiau serga, todėl yra lengviau nuimti mechanizuotai. Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui, sandėliavimui. Geitai auga ir turi stiprią lapiją, juos mažiau stelbia piktžolės, todėl tinka auginti ekologiniuose ūkiuose.

CARDEAL F1

Vidutinio vėlyvumo hibridinė veislė, vegetacija 90-100 d. Labai tinka auginti ankstyvam mažų "baby" burokėlių derliui, tačiau Lietuvoje dažniausiai auginamas šviežiam vartojimui, perdirbimui ir sandėliavimui. Labai didelis cukraus kiekis šakniavaisiuose >13%. Augalo lapija stati ir stipri, mažiau serga, todėl yra lengviau nuimti mechanizuotai. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele, tamsiai raudonos spalvos, geros prekinės išvaizdos.

KESTREL F1

Vidutinio vėlyvumo hibridinė veislė. Vegetacija 90-100 d. Puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Šakniavaisiai apvalūs, tamsiai raudonos spalvos, geros prekinės išvaizdos. Tinka šviežiai produkcijai ir perdirbimui. Lapija stati ir sveika, mažiau serga, todėl yra lengviau nuimti derlių mechanizuotai. Šakniavaisiuose sukaupia daug cukraus >12%.

RODINA F1

Vidutinio vėlyvumo hibridinė veislė, vegetacija 90-100 d. Šakniavaisiai cilindriniai, turi daug cukraus, gražios tamsiai raudonos spalvos, gero skonio. Puikiai tinka perdirbimui, pav. pjaustyti griežinėliais. Gerai sandėliuojasi. Lapija labai stipri. Rekomenduojama sėti 600 000 sėklų į ha.

Nauja!

BE10317 F1

Puikus pasirinkimas "baby" burokėlių auginimui ir ankstyvam derliui sezono pradžioje. Šakniavaisiai vienodi ir geros kokybės. Vegetacija 90 dienų. Tinkamas įvairioms rinkoms (šviežiam vartojimui, perdirbimui, sandėliavimui).

GOLDEN EYE F1

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vegetacija – 90 dienų. Šakniavaisiai apvalūs, lygūs, vienodi, ryškiai geltonos spalvos - „auksinės", verdant išlaiko spalvą. Tinkami šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Labai saldūs, skanūs.

DETROIT DARK

Derlinga daugiadaigė burokėlių veislė. Derlinga, šakniavaisiai tamsiai raudonos spalvos, vidutinio dydžio, apvalūs, švelnaus, kiek saldoko skonio. Gerai auga įvairiose dirvose. Lapai 40-45 cm aukščio, statūs. Tinka vartoti šviežius, konservuoti, sulčių gamybai. Gerai sandėliuojasi.

Burokėliai

Veislės pavadinimas	Vegetacija (dienomis)	Sėjos norma, kg/ha vnt./ha	Šakniavaisio forma	Paskirtis	Savybės
Aurora F1	90-100 d.	500-600 tūkst./ha „baby" produkcijai 1,2-1,3 mln./ha	apvalūs	perdirbimui ir sandėliavimui	Atsparūs Rhizomania and Rhizoctonia
Red Hawk F1	75-85 d.	500-600 tūkst./ha „baby" produkcijai 1,2-1,3 mln./ha	apvalūs	tinka ankstyvai produkcijai, perdirbimui	geras skonis, tamsiai raudonas vidus
Cardeal F1	90-100 d.	500-600 tūkst./ha „baby" produkcijai 1,2-1,3 mln./ha	apvalūs	šviežiai produkcijai, ypač „baby" produkcijai ir sandėliavimui	derlingas, gera kokybė, turi daug cukraus, galima naudoti kaip „dažus"
Kestrel F1	90-100 d.	500-600 tūkst./ha „baby" produkcijai 1,2-1,3 mln./ha	apvalūs	šviežiai produkcijai, perdirbimui ir sandėliavimui	derlingas, gera kokybė, turi daug cukraus
Rodina F1	90-100 d.	600-900 tūkst./ha	cilindriniai	šviežiai produkcijai, perdirbimui ir sandėliavimui	derlingas, gera kokybė, turi daug cukraus
BE10317 F1	90 d.	500-600 tūkst./ha „baby" produkcijai 1,2-1,3 mln./ha	apvalūs	šviežiai produkcijai, perdirbimui ir sandėliavimui	derlingas, gera šakniavisių kokybė, ankstyvam derliui
Golden Eye F1	90 d.	500-600 tūkst./ha	apvalūs	šviežiai produkcijai, perdirbimui	gero skonio, saldūs, spalva išlieka termiškai apdorojus
Detroit Dark	80-90 d.	500-600 tūkst./ha	apvalūs	šviežiai produkcijai, perdirbimui	gerai auga įvairiose dirvose

Ridikėliai

CELESTA F1

Labai ankstyvi, lengvai auga ir formuoja vienodus, ryškiai raudonus, apvalius šakniavaisius. Labai gera vidinė struktūra. Jie puikiai auga įvairiomis sąlygomis. Tinka auginti visą sezoną šiltnamiuose ir lauke.

VIENNA F1

Ankstyva hibridinė veislė, tinka auginti viso sezono metu. Šakniavaisiai apvalūs, ryškiai raudoni, blizga, dideli, užauga iki 50 mm skersmens, ilgai neiškorija ir nesutrūksta.

CHERIETTE F1

Ankstyva, labai derlinga hibridinė veislė. Šakniavaisiai ryškiai raudonos spalvos, rutulio formos, labai vieodi, gerai auga šiltuoju metų laiku. Ridikėliai yra saldaus skonio, traškūs ir sultingi. Tinka auginti viso sezono metu.

KARMINA

Prailgintos formos ridikėliai. Šakniavaisiai pailgos kūgio formos su tamsiai raudonos spalvos. Šaknies galiukas baltas. Sėjama nuo vasaros vidurio. Ankstesnės sėjos šakniavaisiai jautrūs sužydėjimui.

BLANKA F1

Ankstyvieji baltieji ridikėliai. Labai tinka ankstyvam auginimui lauke. Gero, švelnaus skonio. Puikiai tinka daryti spalvotus rišulėlius.

LILANA F1

Ankstyvi violetiniai ridikėliai, puikaus skonio. Apvalūs. Minkštimas baltas, traškus. Atsparūs trūkinėjimui. Gera veislė ankstyvai pavasario arba rudens sėjai.

MISATO ROSE FLESH F1

Hibridinė arbūzinių ridikų veislė. Šakniavaisiai kreminiai baltos ar šviesiai žalios išorės su blizgiu, raudonai violetiniu minkštimu, saldaus, švelniai aštraus skonio, panašaus į ropes. Apvalūs šakniavaisiai užauga per 28-42 d,gali būti nuimami teniso kamuoliuko dydžio. Geriausia auginti rudens derliui, nors galima auginti ir vasaros derliui.

PANTER F1

Juodieji ridikai. Vegetacija 70 dienų.Šakniavaisiai apvalūs, 6-9 cm skersmens, vidus baltas. Tinkami ilgam sandėliavimui. Sėti vasaros viduryje.

Salierai

Lapkotiniai salierai

MERLIN F1

Ankstyva hibridinė veislė su ilga baltąja dalimi ir tamsiai žaliais lapais. Salierus galima auginti vasaros ir rudens derliui.

Gumbiniai salierai

IBIS

Šakniavaisiai lygūs, apvalūs, vienodi, turintys nedaug šoninių šaknų, lengva nuvalyti, vidus labai geros struktūros: baltas, nėra tuščių ertmių. Atsparus sužydėjimui. Labai atsparus septoriozei. Tinka šviežiąm vartojimui ir perdirbimui. Šakniavaisio masė 1,5-2,0 kg.

NEON semo
Ankstyva derlinga veislė. Šakniavaisiai apvalūs, lygūs, turi mažai šoninių šaknų. Vidus baltas, švelnaus skonio, be tuštumų. Gaminant patiekalus išlieka baltas. Rekomenduojami šviežiam vartojimui, perdirbimui ir ilgam sandėlaivimui. Augalai atsparūs mozaikos virusui ir septoriozei.

Pastarnokai

DLOUHY BILY semo
Labai derlinga veislė. Lapija stipri, šakniavaisiai ilgi 25–30 cm. Labai atsparūs ligoms. Puikiai tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui, ypač džiovinimui. Labai gerai sandėliuojasi. Vegetacija apie 200 dienų nuo sėjos iki derliaus nuėmimo (Centrinės Europos sąlygomis).

BIELAS semo
Ankstyvesnė veislė nei DLOUHY BILY (apie 180 dienų nuo sėjos Vidurio Europos sąlygomis). Lapija stipri, šakniavaisiai kūginiai, lygūs ir platūs. Tinka šviežiam vartojimui, ilgalaikiam sandėliavimui ir perdirbimui.

Bulvės

Nauja! **AZTEC GOLD** TPC
Vidutinio ankstyvumo bulvės oranžiniu minkštimu, santykinai dideliu sausųjų medžiagų kiekiu, atspari vėlyvam lapų ir gumbų marui. Sausųjų medžiagų – 21,4 %. Virimo tipas B.

BARCELONA TPC
Barcelona užaugina vienodus, didelius pailgai ovalinius gumbus, turi šviesiai geltoną luobelę, negilias akutes ir šviesiai geltoną minkštimą. Geros kokybės maistinės bulvės. Dideli-vidutinio dydžio gumbai. Labai derlinga veislė. Sausųjų medžiagų kiekis 19,5%. Virimo tipas B. Branda – vidutinio ankstyvumo.

BERGERAC TPC
Bergerac užaugina vienodus, pailgus gumbus, turi violetinę luobelę, negilias akutes ir violetinį minkštimą.Geros kokybės maistinės bulvės. Maži gumbai. Derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis yra 20,5%. Virimo tipas BC. Branda – vidutinio vėlyvumo.

Nauja! **BOSTON** TPC
Boston užaugina vienodus, labai didelius ovalinius gumbus, turi raudoną luobelę, negilias akutes ir šviesiai geltoną minkštimą. Geros kokybės maistinės bulvės. Dideli gumbai. Derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,0%. Virimo tipas B. Branda – vidutinio ankstyvumo.

MADRID TPC
Madrid bulvės turi šviesiai geltoną luobelę ir kreminės spalvos minkštimą. Geros kokybės stambiagumbės bulvės. Labai derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 19,1 %. Virimo tipas AB, o po virimo - spalvos nepakeičia. Branda – vidutinio ankstyvumo.

MONTE CARLO TPC
Monte Carlo užaugina vienodus, didelius ovalinius gumbus, turi šviesiai raudoną luobelę, negilias akutes ir baltą minkštimą. Geros kokybės maistinės bulvės. Virimo tipas - B, po virimo spalvos nepakeičia. Dideli/vidutinio dydžio gumbai. Labai derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,5 %. Branda – vidutinio ankstyvumo.

MONTREAL TPC
Montreal yra puikaus skonio ir tvirtos tekstūros. Gumbai – pailgo ovalo formos. Luobelės spalva ryški, šviesiai geltona, minkštimo spalva - kreminė. Dideli gumbai, labai derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,5 %. Virimo tipas AB. Branda - ankstyva, vegetacija 70-80 d.

Nauja! **MISS BLUSH** TPC
Miss Blush – puikios išvaizdos apvaliais, vidutinio dydžio gumbais bulvės. Gumbų luobelė raudonos/geltonos spalvos, giliomis akutėmis, minkštimas – kreminis. Sausųjų medžiagų 20-21,5%. Virimo tipas – B. Bulvės vartojamos kaip stalo, salotinės ar "baby" bulvės. Branda – vidutinio ankstyvumo.

SALVADOR TPC
Salvador užaugina vienodus, didelius/labai didelius ovalinius gumbus, turi geltoną luobelę, plokščias akutes ir šviesiai geltoną minkštimą. Geros kokybės maistinės bulvės. Derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 19,0%. Virimo tipas B. Branda – vidutinio ankstyvumo.

SIENA TPC
Siena gumbai yra pailgi, luobelės spalva -geltona, minkštimo spalva – geltona, akutės negilios. Pailgi gumbai, maži/vidutinio dydžio, derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,0%. Virimo tipas A. Labai skanios, gali būti naudojamos kaip "baby" bulvytės. Branda – vidutinio ankstyvumo.

TORONTO TPC
Toronto gumbai yra pailgi. Luobelės spalva yra šviesiai geltona, minkštimo spalva – šviesiai geltona, akutės negilios, platūs gumbai, labai derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,5 %. Virimo tipas AB. Branda – vidutinio ankstyvumo.

Kompleksinės trąšos su mikroelementais DRT

NOVALON



Produkto aprašymas:

Vandenyje labai gerai tirpstančios trąšos, kurių sudėtis pritaikyta tręšti augalus per laistymo sistemą arba per lapus. Tręšiant augalus su NOVALON gaunama nauda:

- spartus ir efektyvus augalų patręšimas per lapus
- aprūpina augalus maisto medžiagomis intensyvaus augimo metu
- padidina augalų atsparumą stresui
- spartina augalų augimą - didina derlių
- pagerina derliaus kokybę

NOVALON FOLIAR DRT

Produkto aprašymas:

Trąšos skirtos augalų patręšimui per lapus. Produkto forma - kristaliniai milteliai, kurie labai gerai tirpsta vandelyje. Trąšų sudėtyje yra paviršiaus aktyviųjų medžiagų, kurios pagerina tirpalo pasiskleidimą ant lapų paviršiaus ir įsiskverbimą į augalo vidų.

- spartus ir efektyvus augalų patręšimas per lapus
- aprūpina augalus maisto medžiagomis intensyvaus augimo metu
- padidina augalų atsparumą stresui
- spartina augalų augimą - didina derlių
- pagerina derliaus kokybę

Agurkai

Nauja!

MADRILENE F1

Seminis grow forward

Labai ankstyva ir derlinga hibridinė agurkų veislė. Augalai atsparūs ligoms ir kenkėjams bei žemoms temperatūroms ankstyvuose augimo tarpsniuose. Vaisiai vienodos formos, labai skanūs, stabilus derlius viso sezono metu. Madrilene F1 gali būti auginami šiltnamiuose ir lauke. Nuėmus derlių, ilgai laikomi agurkai nevysta ir labai transportabilūs. Atsparumas ligoms: HR: CMV/Ccu,Px

Nauja!

MADEIRA F1

Seminis grow forward

Labai ankstyva hibridinė veislė, turinti didelį derliaus potencialą, skirta auginti šiltnamiuose pavasario, vasaros ir rudens derliui. Augalai atviro augimo tipo, atsparūs ligoms ir šviesos trūkumui, turi stiprią šaknų sistemą. Vaisiai cilindro formos, 10-12 cm ilgio, spygliuoti, transportabilūs. Nuėmus derlių vaisiai ilgai išlieka kokybiški. Atsparumas ligoms: HR: CMV/Ccu IR:Px

MIRABELLE F1

Seminis grow forward

Labai ankstyva, derlinga partenokarpinė agurkų hibridinė veislė. Vaisiai karpuoti, gražios formos, maža sėklide, šviesesni, nei Mandy, nekartūs, derlingi. Vaisių ilgio ir skersmens santykis L/D = 3,4:1. Puikiai tinka kornišonams auginti. Atsparus kladosporiozei, tikrajai miltligei ir vid. atsparūs agurkų mozaikos virusui. Tinka auginti stikliniuose ir polietileniniuose šiltnamiuose.

MERENGUE F1

Seminis grow forward

Ankstyva, labai derlinga hibridinė partenokarpinių agurkų veislė. Augalai stiprūs, duoda daug šoninių atžalų. Augalai pusiau atviro augimo tipo, o tai palengvina priežiūrą. Vaisiai cilindriniai, labai vienodi, geros kokybės ir gero skonio, nekartūs, vidutiniškai žalios. Pakankamai atsparus netikrajai miltligei. Galima auginti stikliniuose ir polietileniniuose šiltnamiuose.

SV 4097 CV F1

Seminis grow forward

Labai ankstyva ir derlinga partenokarpinė hibridinė veislė. Augalai kompaktiški, atviri, generatyvinio augimo, mažiau leidžia šoninių atžalų, turi stiprią šaknų sistemą. Mažiau jautrūs temperatūrų kaitai ir nepakankamam apšvietimui. Vaisiai 11-13 cm ilgio, 3,0-3,4 cm skersmens, 90-100 g svorio, tvirti, geros kokybės, tamsiai žali, skanūs, traškūs. Gerai laikosi nuskinti.

Nauja!

TESLIN F1

SAKATA PASSION in Seed

Ankstyva, labai derlinga hibridinė veislė. Partenokarpiniai agurkai auginimui šiltnamiuose. Augalas vidutinio stiprumo, atviro tipo, gerai ataugantis. Vaisiai vienodi, tiesūs, tamsiai žali, 11-13 cm ilgio. Rekomenduojama auginti pavasario ir rudens derliui. Atsparumas ligoms: HR= CMV/Cca/Ccu; IR:CVYV/Px

Nauja!

PHARO F1

SAKATA PASSION in Seed

Mini ilgavaisiai agurkai, auginami šiltnamyje ankstyvam pavasariniam arba rudens derliui. Vaisiai 16-18 cm ilgio, tamsiai žalios spalvos, lygūs, vienodi, be spygliukų. Auga po 1-2 vaisius iš mezgimo taško. Labai švelnaus ir malonaus skonio. Atsparumas ligoms: HR:CMV/Cca/Ccu / IR:CVYV/Px

Nauja!

JAGUAR F1

TAKII SEED

Ankstyva, labai derlinga veislė, galima auginti pavasario ir rudens derliui. Augalas pusiau atviro augimo tipo. Skirti auginti šiltnamiuose. Vaisiai cilindriniai, labai vienodi, gero skonio, tamsiai žali. Vidutinė vaisiaus masė 120-150 g, ilgis 14-15 cm, skersmuo 2,0-2,5 cm . Atsparumas ligoms: HR:Cca,Ccu

BARA F1 (lauko agurkai)

semo

Ankstyvi, derlingi, vabzdžių apdulkinami trumpavaisiai lauko agurkai. Vaisiai tamsiai žalios spalvos, ploni, baltais spygliukais, vienodi, puikiai tinka rauginti ir marinuoti. Veislė yra pakankamai atspari netikrajai miltligei.

BOHEMIA F1 (lauko agurkai)

semo

Ankstyvi, vabzdžių apdulkinami trumpavaisiai lauko agurkai. Vaisiai tamsiai žali, ploni, baltais spygliukais, puikiai tinka perdirbimui. Derlingi, gerai toleruoja aukštas temperatūras, yra pakankamai atsparūs netikrajai miltligei.

IWONNA F1 (lauko agurkai)

semo

Vidutinio ankstyvumo, vabzdžių apdulkinami trumpavaisiai lauko agurkai. Vaisiai traškūs, vidutiniškai žali, skanūs, baltais spygliukais, sveiki, puikiai tinka rauginti, nes išlaiko gražią spalvą.

Agurkai

Veislės pavadinimas	Vaisių ilgio ir skersmens santykis	Ankstyvumas	Paskirtis	Savybės
Madrilene F1	3,4:1	Labai ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Vaisiai vienodos formos, labai skanūs, stabilus derlius viso sezono metu
Madeira F1	3,1:1	Labai ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Ankstyvam derliui, tinka auginti pavasario, vasaros ir rudens derliui. Vaisiai kokybiški per visa augimo ciklą
Mirabelle F1	3,4:1	Labai ankstyvi	Partenokarpiniai. Puikiai tinka kornišonams auginti, marinavimui, rauginimui	Derlingi, vaisiai karpuoti, gražios formos, transportabilūs
Merengue F1	3,4:1	Labai ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Derlingi. Vaisiai vidutiniškai žalios spalvos, geros išvaizdos
SV 4097 CV F1	3,3:1	Labai ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Labai derlingi. Vaisiai tamsiai žali, geros išvaizdos
Teslin F1	3,4:1	Ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Vaisiai vienodi, tiesūs, su spygliukais, tamsūs.
Pharo F1	8:1	Ankstyvi	Mini ilgavaisiai agurkai, šviežiam vartojimui	Labai derlingi, vaisiai vienodi,be spygliukų
Jaguar F1	6:1	Ankstyvi	Partenokarpiniai. Šviežiam vartojimui, koservavimui	Vaisiai cilindriniai, labai vienodi, gero skonio, tamsiai žali, transportavilūs.
Bara F1	**3,2:1**	**Ankstyvi**	**Lauko agurkai. Šviežiam vartojimui, puikiai tinka rauginti ir marinuoti**	**Derlingi. Vaisiai tamsiai žali, ploni, baltais spygliukais, vienodi**
Bohemia F1	**3,2:1**	**Ankstyvi**	**Lauko agurkai. Šviežiam vartojimui, perdirbimui**	**Derlingi. Vaisiai tamsiai žali, ploni, baltais spygliukais**
Iwonna F1	**3,2:1**	**Vidutinio ankstyvumo**	**Lauko agurkai. Tinkami perdurbimui, ypač rauginimui**	**Vaisiai šviesiai žali, traškūs, skanūs, baltais spygliukais**

Organinės granuliuotos trąšos

SIMONIS B.V.

AGROGOLD

Trąšos sukurtos ir gaminamos Olandijoje.
Pagrindinė žaliava - vištų mėšlas.
Organinės trąšos padeda išspręsti daugybę agronominių problemų:

- pagerina dirvos struktūrą
- aprūpina augalus maisto medžiagomis
- mažina dirvos eroziją ir išsekimą
- skatina dirvos mikroorganizmų veiklą
- išsaugo vandens balansą dirvoje

Cukinijos

AZIAD F1
Labai ankstyva hibridinė veislė. Vaisiai cilindro formos, šviesiai žalsvi. Gerai išsilaiko po derliaus nuėmimo. Tinka auginti atviram grunte ir plėveliniuose šiltnamiuose. Atspari ligoms ir virusams IR: ZYMV/WMV

AMBASSADOR F1
Ankstyvos, krūminės cukinijos. Vaisiai vidutiniškai žalios spalvos, 18-20 cm ilgio, cilindro formos, lengva skinti.

TOP KAPI F1
Derlinga vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai šviesiai žalios spalvos, cilindriniai, apie 18 cm ilgio. Ilgas derliaus nuėmimo periodas. Galima auginti šiltnamiuose ir lauke.

LEMONA F1
Augalas kompaktiškas. Vaisiai ryškiai geltonos spalvos, vienodi, cilindriniai, 20-25 cm ilgio, sveria 250-300 g. Puikios kokybės.

Patisonai

DELIKATES
Derlinga baltos spalvos patisonų veislė su su kreminės spalvos minkštimu. Vidutiniškai atsparus miltligei. Vegetacija -70 dienų nuo sėjos iki derliaus nuėmimo.

SUNSEANCE F1
Skaisčiai geltonos spalvos labai ankstyva hibridinė patisonų veislė. Vegetacija – 60 dienų. Vaisiai auga ant ilgų žiedstiebių, todėl lengva nuimti derlių. Gali būti naudojami tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui. Augalai yra šiek tiek kompaktiškesni nei kitų veislių. SUNSEANCE F1 tinkama auginti atvirame grunte, gali būti auginami po priedangomis itin ankstyvam derliui.

Moliūgai

Nauja!
COLINKY F1
Labai produktyvi Hokaido tipo hibridinė veislė, užauginanti aukštos kokybės vaisius. Vaisiai – tamsiai oranžinės spalvos, vienodi, vaisiaus masė 1,5 kg. Puikaus skonio, turintys didelį kiekį cukraus.

ORANGE SUMMER F1
Ankstyva, derlinga hibridinė veislė. Augalas pusiau krūminis, gerai derantis ir vėsesnę vasarą. Vaisių žievė ryškiai oranžinė, vaisiai sveria 1,2-1,6 kg. Minkštimas oranžinis, labai saldus. Vaisiai gerai išsilaiko iki vasario mėnesio.

UCHIKI KURI
Moliūgų vaisiai apvalūs, 0,7-1,2 kg svorio, raudonai-oranžinės spalvos, malonaus riešutus primenančio skonio ir kvapo. Vidus oranžinis. Vegetacija 70 dienų. Minkštimas ryškiai oranžinis, turintis daug karotino, saldus. Dekoratyvūs, tinka ir laikymui. Subrendę vaisiai išsilaiko 2-3 mėnesius.

ROUGE VIT D'ETAMPES
Vidutinio ankstyvumo veislė. Vaisiai plokščiai apvalūs, 20-50 cm diametro, ryškiai oranžinės spalvos, 8-20 kg svorio. Minkštimas oranžinės spalvos. Tinka šviežiam naudojimui ir sandėliavimui.

Nauja!
MIELUNA F1
Ankstyva, derlinga hibridinė sviestinių ('Butternut' tipo) moliūgų hibridinė veislė šviežiam vartojimui. Vaisiaus masė 1 – 1,3 kg, minkštimo spalva tamsiai oranžinė, gerai sandėliuojasi. Augalai stiprūs ir sveiki. Vaisiai subręsta ir Šiauriniuose reginiuose. Atsparumas ligoms: IR:Px

ARIEL F1
Svietinis ('Butternut' tipo) moliūgas. Stipraus augimo vijoklinis augalas. Vaisiai apie 0,8-1,5 kg. svorio, kriaušės formos, saldūs, odelė šviesiai kreminė, vidus ryškiai oranžinės spalvos. Nesuskyla, atsparūs stresinėms klimato sąlygoms, vidutiniškai atsparūs miltligei. Atsparumas ligoms: IR:Px

TERRAFIN F1
Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Augalas užaugina 4-5 vaisius, kurių skersmuo siekia 20 -25 cm ir sveria 3,5-4,5 kg. Vaisiai apvalūs, šiek tiek rievėti, ryškiai oranžinės spalvos. Moliūgai puikiai tinka Helloweeno šventei.

Nauja!
FLYNN F1
Vidutinio ankstyvumo hibridinė moliūgų veislė. Augalas užaugina 2-3 vaisius, kurių diametras siekia 20 -22 cm ir sveria 3-4 kg. Vaisiai apvalūs, šiek tiek rievėti, tamsiai oranžinės spalvos. Idealūs moliūgai Helloweeno šventei. Tinka ilgam sandėliavimui.

HELLOWEEN
Vidutino vėlyvumo veislė, užauga per 110 d. Vaisiai apvalūs, dideli, užauga iki 8-9 kg, ryškiai oranžinės spalvos storu ir standžiu minkštimu. Tinka tiek maistui, tiek drožybai

MUSQUEE DE PROVENCE
Moliūgų vaisiai briaunoti, apie 6-8 kg svorio, 25-40 cm skersmens, minkštimas labai aromatingas, skanus, saldus, oranžinės spalvos. Jaunas vaisius yra tamsiai žalias, o nokdamas keičia spalvą į rudą ar oranžinę. Tinka šviežiam naudojimui, sulčių gamybai, sandėliuojasi iki 6 mėn.

CROWN PRINCE F1
Vaisiai plokščiai apvalūs, briaunoti, 3,0-4,0 kg svorio, pilkos spalvos. Vidus ryškiai oranžinės spalvos, mėsingas, saldus, riešuto skonio. Labai gerai laikosi žiemą. Tinka vartoti šviežius ir perdirbimui.

Nauja!
LUNGA DI NAPOLI
Muskatiniai moliūgai. Vaisiai pailgi, užauga iki 16-18 kg svorio, tamsiai žali, kokybiški. Minkštimas oranžinis, saldaus skonio, aromatingas, tinka ilgam sandėliavimui. Maistui vartojami švieži, kepti, virti.

Arbūzai

Nauja!
PODIUM F1
Ankstyva, labai derlinga besėklių arbūzų hibridinė veislė. Vaisiai vienodi, lygūs, sultingi, traškūs, minkštimas tamsiai raudonas ir labai saldus. Vaisiaus masė 4-6 kg. Tinka auginti lauke ir po priedangomis.

Melionai

Nauja!
AIKIDO F1
Ideali hibridinė veislė ankstyvam derliui. Vaisiai apvalūs, 1,0-1,7 kg, žievė geltona, tinklinė, minkštimas viduje – šviesiai žalias.

Nauja!
BARI F1
Hibridinė melionų veislė gausiam ir ankstyvam derliui. Žievė – gelsva su tankiu, vienalyčiu tinkleliu. Vaisiai – ovalūs, gražiai oranžinės spalvos, geros tekstūros. Vaisiaus masė – 1,2-1,5 kg. Atsparus ligoms.

Pomidorai

Indeterminantiniai, dideliais vaisiais

JALILA F1

SAKATA PASSION in Seed

Ankstyvi, indeterminantiniai (aukšti) pomidorai, tinka auginti plastikiniuose šiltnamiuose. Augalas stiprus. Pomidorų vaisiai dideli, 200-250 g masės, ryšiai raudoni, salotinio tipo, apvalūs, puikiai išlaiko prekinę išvaizdą, yra puikaus skonio. Atsparumas ligoms: HR: ToMV: 0-2/Fol:0,1/Vd:0 IR: TYLC/TSWV/Mi

BIG BEEF F1

De Ruiter

Labai ankstyva indeterminantinių pomidorų hibridinė veislė. Persodinus pradeda derėti po 73 dienų. Pomidorai mėsingi, labai skanūs, didelis derliaus potencialas. Vaisių masė 280-340 g. Atsparumas ligoms: HR: ToMV/Va/Vd/ Fol: 0-2 Si IR: MaMiMj

Nauja!

DR7024TS

De Ruiter

Labai įspūdingi indeterminantiniai pomidorai - smailios širdies formos, gero skonio ir tekstūtos derinys. Vaisiaus masė 240-340 g. „Jaučio širdies“ tipo pomidorai. Dėl šių savybių tapo rinkos lyderiu. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2 /ToTV/Ff:A-E / Fol:0/For /Va:0 /Vd:0

AUREA F1

De Ruiter

„Jaučio širdies“ tipo pomidorai, viršus siaurėjantis, briaunuotas, labai patrauklios formos. Vaisius mėsingas, gerai užpildytas, be tuštumų sėklų kamerose. Vaisiaus masė 180-250 g, švelnaus skonio, rausvai rožinės spalvos. Indeterminantiniai pomidorai. Augalai atviro augimo tipo, labai stiprūs ir tvirti. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2 /Va:0 /Vd:0 .

RALLY F1

Labai ankstyva pomidorų hibridinė veislė. Augalas pusiau atviro augimo tipo, kekės gana arti viena kitos. Pomidorų vaisiai šiek tiek briaunuoti, subręsta labai vienodai, vaisiaus masė 190-220 g, ilgai išlaiko prekinę išvaizdą. Atsparūs tiek aukštoms tiek žemesnėms temperatūroms. Tinka auginti trumpo derėjimo ciklo derliui polietileniniuose šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: ToMV/Cf: 1-5/ VaVd / Fol: 0,1/ MaMiMj /TSWV.

BURAN F1

Ankstyva hibridinė veislė. Vaisiai plokščiai-apvalūs, vienodi, patrauklios spalvos, be žalių dėmelių. Vaisiaus masė 180-230 g. Galima auginti trumpo arba prailginto derėjimo ciklo derliui stikliniuose ir polietileniniuose šiltnamiuose. Augalas stiprus, pusiau atviro augimo tipo, puikiai mezga. Atsparumas ligoms: ToMV /Cf: 1-5 /VaVd / Fol: 0,1/ MaMiMj/ TSWV

BERBERANA F1

Labai ankstyva, derlinga, reguliariai deranti hibridinė veislė. Augalai stiprūs, turi stiprią šaknų sistemą, atsparūs stresinėms augimo sąlygoms. Tinka auginti trumpo derėjimo ciklo derliui polietileniniuose šiltnamiuose. Pomidorų vaisiai raudoni, plokščiai-apvalūs, dideli, mėsingi.Vaisiaus masė 280-320 g. Atsparumas ligoms: ToMV/TSWV/VaVd/Fol:0-2/Cf:1-5/ Fol:0,1/ MaMiMj.

Indeterminantiniai, vidutinio dydžio, pailgais vaisiais

OCEANO F1

SAKATA PASSION in Seed

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai ovalo formos, ryškiai raudoni, tvirtos struktūros, patrauklios išvaizdos. Vaisiaus masė 120 - 150 g. Derlingi ir atsparūs ligoms. Tinka auginti nešildomuose šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: HR:ToMV:0,1/Vd:0/Fol:0,1,2/Ff:A-E IR: TSWV/ TYLCV

PABLO F1

SAKATA PASSION in Seed

Labai ankstyva hibridinė veislė. Vaisiai plokščiai-apvalūs, raudoni, gero skonio ir kvapo, geros išvaizdos.Vaisiaus masė 150 - 170 g. Augalas vidutinis, tinka auginti plastikiniuose šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: HR:ToMV:0,1,2/ Fol: 0,1 IR:TSWV

NARAM F1

Ankstyva hibridinė veislė. Augalas kompaktiškas, reguliariai derantis. Vaisiai pailgi, geros kokybės, vaisiaus masė – 140 g. Atsparumas ligoms:HR: ToMV/ VaVd/ Fol:0,1,Cf:2,4 IR: MaMiMj.

Indeterminantinai, spalvotais vaisiais

Nauja!

PINK DELI F1

TAKII SEED

Ankstyva avietinių pomidorų hibridinė veislė, dideliais vaisiais – vaisiaus masė 200 g. Pink Deli yra ankstyva Momotaro tipo veislė. Puikios tekstūros ir skonio pomidorai, odelė plona, tačiau netrūkinėja. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol 0,1/For/Ff: A,D / IR: Ma,Mi,Mj

Gamintojas: TAKII SEED

Nauja!

PINK WAND F1

Labai ankstyva partenokarpinė hibridinė pomidorų veislė. Vaisiai labai kokybiški, vienodo dydžio, labai gero skonio, vaisiaus masė 180-200 g. Vengti persodininmo esant labai aukštoms temperatūroms. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E/Ss/For IR: Mi

FUJI PINK F1

SAKATA PASSION in Seed

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai apvalūs, dideli, avietinės spalvos, gražios formos, saldūs, skaniai kvepia. Vaisiaus masė 180 - 200 g. Labai gerai išlaiko prekinę išvaizdą. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0,1,2/ Ff: 1-5/ VaVd/ Fol: 0,1 IR: MaMiMj.

Gamintojas: SAKATA

PINK DREAM F1

SAKATA PASSION in Seed

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai avietinės spalvos, salotinio tipo, apvalūs, labai vienodi, puikiai išlaiko prekinę išvaizdą, netrūkinėja, yra puikaus skonio ir kvapo. Vaisiasu masė 220 - 240 g. Gerai auga nešildomuose šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0,1,2/ Ff: 1-5/ Vd:0/ Fol: 0,1/ Ss IR: TYLCV/ Mi

TOMIMARU MUCHOO F1

De Ruiter

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai apvalūs, avietinės spalvos, labai saldūs. Vaisiaus masė 160 - 180 g. Augalai aukšti generatyvinio augimo, atviras, lapai siauri. Galima auginti mineralinėje vatoje arba organinuose substratuose. Atsparumas ligoms: ToMV/Cf:1-5/ Fol: 0,1/ For/ On/ Va/ Vd/ Si.

Nauja!

GOURMANSUN F1

CLAUSE

Ankstyva indeterminantinių „Jaučio širdies“ tipo hibridinė pomidorų veislė. Vaisiai geltoni, dideli, širdies formos iš Gourmandia pomidorų linijos. Vaisiaus masė 240 - 280 g. Puikaus skonio su sultingu minkštimu, kuris sunokęs įgauna liepsnojantį atspalvį. Atsparumas ligoms: HR: Fol:0,1,2; ToMV:0,1,2; Va:0; Vd:0

BEORANGE F1

De Ruiter

Vaisiai oranžinės spalvos, dideli, 200-230g svorio, skanūs, mėsingi. Galima auginti prailginto derėjimo ciklo derliui stikliniuose ir polietileniniuose šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: HR:ToMV Cf:1-5 Fol:0,1 For Va Vd Si.

TAIYO F1

TAKII SEED

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė. Vaisiai geltoni, o pilnai sunokę oranžinės spalvos, apvalūs-plokščiai apvalūs, saldaus skonio, kvapnūs. Vaisiai tvirtesni negu kitų veislių geltoni pomidorai, gerai laikosi transportuojant. Kekės kompaktiškos, jose - po 3-5 vaisius. Augalai vidutinio augumo, stiprūs. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol 0,1/Ff: A-E| IR: Ma,Mi,Mj

LEMON BOY F1

De Ruiter

Ankstyva hibridinė indterminantinių pomidorų veislė. Vegetacija 72 dienos. Saldaus skonio, citrinos geltonumo spalvos vaisiai. Vaisiaus masė 200 g, labai gražiai apvalūs. Atsparumas ligoms: V/Fol/ MaMiMj/ A/ST

BRUNITO F1

semo

Kumato tipo pomidorai. Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, turinti didelį atsparumą grybinėms ligoms ir vaisių trūkinėjimui. Galima auginti šiltnamiuose ir lauke. Subrendę vaisiai tampa rudos spalvos. Brunito – labai derlinga, atspari stresui hibridinė veislė. Vaisaus masė 100 -120g. Atsparumas ligoms: HR: ToMV 0-2, VaVd, Fol:0,1

Indeterminantinai, smulkiavaisiai

Populiariausia!

RHIANNA F1

SAKATA PASSION in Seed

Unikalios, ryškiai avietinės spalvos ir puikaus skonio pomidorai, vaisių masė 20-25 g. Labai deringa hibridė indeterminantinių pomidorų veislė. Augalai labai stiprūs, ilgai dera. Atsparumas ligoms: HR:ToMV:0,1/ Fol:0,1/Vd:0/Pf:A-E/For/Ss IR:M

Nauja!

LEMONSTAR F1

Labai derlinga, atspari ToBRFV mini slyvinių pomidorų hibridinė veislė. Labai stiprūs, ilgai augantys augalai. Vaisiai puikaus skonio, ypatingai gražios geltonos spalvos, netrūkinėja. Vaisiaus masė 12-14 g. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E IR: ToBRFV/Ss

Nauja!

CHOCOSTAR F1

Labai derlinga, atspari ToBRFV mini slyvinių pomidorų hibridinė veislė. Labai stiprūs, ilgai augantys augalai. Vaisiai puikaus skonio, ypatingai gražios rudos (šokoladinės) spalvos, netrūkinėja. Vaisiaus masė 10-12 g. Gerai auga esant dirbtinam apšvietimui. Atsparumas ligoms: HR: ToMV:0-2/Fol:0/Ss IR: ToBRFV/Mi

BEJBINO F1

Ankstyva hibridinė kokteilinių pomidorų veislė, Augalai indeterminantiniai, atviro augimo tipo. Vaisiai blizgantys, raudoni, saldaus ir malonaus skonio. Vidutinė vaisiaus masė 30–40 g, skersmuo – 2,5 cm. Rekomenduojama auginti tiek šiltnamyje, tiek lauke.

Determinantiniai, krūminiai

Nauja!

PINK BOMB F1

Determinantiniai avietiniai pomidorai. Vaisiai apvalūs, avietinės spalvos, saldūs, gero skonio. Labai ankstyvi. Vaisius sveria 180-210g. Kai sunoksta nelieka žalių dėmių ant vaisiaus. Tinka auginti lauke ir šiltnamyje. Atsparumas ligoms: HR: ToMW:0-2/ Pf: A-E/Fol:0.1/Vd:0 IR:Mi

TOMATINA F1

Labai ankstyva hibridinė veislė. Vaisiai puikaus skonio, raudoni, apvalūs, dideli, sveria 250-300 g, kokybiški. Atsparumas ligoms: Vd: 0, Fol: 0,1, TYLCV

TROY F1

Ankstyva hibridinė veislė. Tai „Jaučio širdies“ tipo pomidorai, vaisiai raudoni, plokščiai-apvalūs, dideli, 250-300 g masės, labai gero skonio, puikios prekinės išvaizdos, gerai laikosi nuskinti. Labai gerai pakenčia aukštas temperatūras, nes augalo vaisiai pukiai uždengti lapais. Atsparumas ligoms: Vd: 0, Fol: 0,1.

POMIDORŲ LIGOS:

Ss - stemfiliozė (Stemphyllium solani);
Ff - lapų rudoji dėmėtligė (Fulvia fulvum A, B, C, D ir E rasės).
ToMV – tabako mozaikos virusas,
VaVd – verticiliozė (lėtasis vytulys),
Fol – fuzariozė (greitasis vytulys) 1 ir 2 rasės,
For – fuzarinis šaknų puvinys,
Ff (Cf) – kladosporiozė (lapų rudoji dėmėtligė) 1-5 rasės,
On – miltligė,
Wi (Si) – lapų sidabriškumas ,
St – septoriozė (šviesmargė),
TSWV – dėmėtasis lapų vytulys,
MaMiMj - nematodai

PAPRIKOS

Saldžiosios paprikos

Nauja!

ESPARTANO F1

Ankstyva Blocky tipo hibridinė veislė. Augalai sveiki, stiprūs, lengvai prisitaiko prie aplinkos pokyčių, galima auginti šiltnamyje ir lauke. Tinka auginti ankstyvam pavasario ir vasaros derliui. Vegetacija 85 d. Vaisiai dideli, geltonos spalvos, vaisiaus masė 225 g. Atsparumas ligoms: HR: Tm 0-2

KVADRY F1

Ankstyva hibridinė veislė. Augalas vidutinio dydžio. Vaisiai kreminės, šviesiai raudonos spalvos, kubinės formos, vidutinis vaisiaus masė - 110 g, sienelės storis - 6 mm. Tinkami auginimui lauke, plastikiniuose tuneliuose ir šiltnamiuose.

KING ARTHUR F1

Ankstyva, derlinga hibridinė veislė. Užauga per 65-70 dienų po daigų persodinimo. Augalo aukštis 50-60 cm, atviro augimo tipo. Gerai mezga vaisius, net prie aukštų temperatūrų. Vaisiai 3-4 sėklalizdžių, raudoni, 11x11 cm dydžio, puikios kokybės. Atsparus Tabako mozaikos virusui, bakterinei dėmėtligei. Rekomenduojama auginti šiltnamiuose ir lauke po priedangomis.

MAGNO F1

Ankstyva ir derlinga Blocky tipo hibridinė veislė. Vaisiaus masė 190-230 g, skersmuo 10-12 cm, oranžinės spalvos, keturių dalių, storomis sienelėmis (6-7 mm). Augalas kompaktiškas, atviro augimo, todėl gerai adaptuojasi esant stresinėms sąlygoms. Tinkami auginimui lauke ir įvairių tipų šiltnamiuose. Atsparumas ligoms: HR: Tm:0-3

SLAVY F1

Vienametės paprikos labai derlinga, ankstyva hibridinė veislė. Vaisiai piramidės tipo, tvirti, ploni ir pailgi, spalva nuo šviesiai žalios iki raudonos, vaisiaus masė 100-110 g. Tinkami auginimui šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose. Vaisiai ilgai laikosi sunokę ant augalo, todėl derlių galima nuimti vienu kartu. Puikiai tinka perdirbimui.

RUBIKA F1

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, Blocky tipo. Augalas vidutinio aukščio. Vaisiai 120-140 g, 6 mm storio sienelėmis. Vaisiai techninėje brandoje yra tamsiai žalios spalvos, o sunokę – tamsiai raudoni. Tinkami auginimui lauke, plastikiniuose tuneliuose ir šiltnamiuose.

ORENY F1

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, augalas žemas. Vaisiai Blocky tipo, techninėje brandoje - tamsiai žalios spalvos, o sunokę – oranžinės. Vaisiai 110-130 g, 6 mm pločio sienelėmis. Tinkami auginimui lauke, plastikiniuose tuneliuose ir šiltnamiuose.

GELBY F1

Vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, Blocky tipo, vidutinio aukščio augalas. Vaisiai techninėje brandoje – kreminės spavos, o sunokę – geltoni. Vaisiai 100-110 g, 5 mm pločio sienelėmis. Tinka auginti plastikiniuose tuneliuose ir šiltnamiuose, o taip pat – lauke.

Aitriosios paprikos

BLACK BULLET F1

Labai derlinga Jalapeno paprikų hibridinė veislė. Augalas didelis, gerai auga tiek esant šaltiems, tiek karštiems orams, vegetacija 90 d. Vaisiai vienodo dydžio, tamsiai žalios blizgios spalvos, sunokę - tamsiai raudoni. Vaisiaus masė 30 g. Atsparumas ligoms: HR: Tm 0,2 IR: TSWV0

FORAJIDO

Jelapeno paprikos. Vaisiai storasieniai, lygia odele, vienodos formos ir dydžio, Subrendę vaisiai būna raudoni, tinka marinavimui ir šviežiam vartojimui.

PUMPKIN

Peru sukurta nauja aitriųjų paprikų veislė. Švelnaus skonio, dekoratyvios išvaizdos - panašūs į mažus moliūgus. Subrendę vaisiai būna raudonos spalvos. Veislė vėlyva, skirta auginti šiltnamyje. Vaisiaus masė 15 g, 2-3 cm skermens (100 -140 000 SHU).

CAROLINA REAPER

Vėlyva aitriųjų paprikų veislė. Vaisiai netaiksiklingos formos, raukšlėti, tamsiai raudonos spalvos.

Aitrumas Skovilio skalėje (SHU) - 2000000. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui, vaisiai džiovinami. Auginama šiltnamiuose, žiemos soduose, karštą vasarą puikiai dera ir lauke. Daigai užauga per 60–80 dienų.

Neorganinės granuliuotos kompleksinės NPK trąšos

NovaTec Classic/ Blaukorn Classic 12-8-16+Mg, S, B, Fe, Zn

Produkto aprašymas:

NovaTec Classic – naujausios COMPO EXPERT gaminamos granuliuotos NPK trąšos su kontroliuojamo veikimo trąšų nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP (dimetilpyrazolio fosfatas), kuris įtakoja amoniako oksidacijos procesą, ir pailgina azoto veikimo laiką, bei sumažina nitratų išplovimo pavojų. DMPP veikimo laikotarpiu (nuo 4 iki 10 savaičių, priklausomai nuo dirvos temperatūros ir drėgmės) amonio virtimas azotu sulėtėja, dėl to augalai jį geriau įsisavina. NovaTec užtikrina, kad augalai gaus abi azoto formas (amoniakinį ir nitratinį).

NovaTec® N-Max 24-5-5 (+2)

skirtas naudoti augalams, kuriems reikia labai daug azoto.

Produkto aprašymas:

- Bechlorės kompleksinės trąšos, ypač tinka daržovėms, sodų ir dekoratyviniams augalams.
- Granuliuotos kompleksinės trąšos su kalio sulfatu (SOP) ir nitrifikacijos inhibitoriumi DMPP (3,4-dimetilpirazolo fosfatas), skirtas pagrindiniam ir papildomam tręšimui chlorui jautriuose augaluose ir druskos paveiktuose dirvožemiuose.
- DMPP veikimo laikotarpiu (nuo 4 iki 10 savaičių, priklausomai nuo dirvos temperatūros ir drėgmės) amonio virtimas azotu sulėtėja, dėl to augalai jį geriau įsisavina
- Maistinių medžiagų pasiskirstymas yra tolygus, nes kiekvienoje granulėje yra visos maistinės medžiagos ir mikroelementai. Galima naudoti per visą vegetacijos laikotarpį. Laistymas skatina greitą poveikį.

Šaknų augimo stimuliatorius

ROOTEX

Produkto aprašymas:

Trąšų sudėtyje yra azoto, fosforo, kalio, amino rūgščių ir fitohormonų. Svarbios savybės ir gaunama nauda:

- ženkliai didina augalų šaknų manę
- efektyviau veikianti šankų sistema įsisavina daugiau maisto medžiagų
- padidina augalų atsparumą stresui - ypač vandens trūkumui
- didina augalų derlių ir kokybę
- patogus naudojimas beicuojant sėklas

Biostimuliantai

BIOPLEX

Produkto aprašymas:

Trąšų sudėtyje yra mikroelementų ir natūralios kilmės biostimuliantai. Svarbios savybės ir gaunama nauda:

- skatina fotosintezę ir medžiagų apykaitą
- stimuliuoja augalų metabolizmą - spartina augimą
- lengvai įsiskverbia į augalus ir gerai įsisavinamos
- didina augalų derlių ir kokybę
- ženkliai sumažina neigiamas streso pasekmes

Agrimatco

Žirniai

AVOLA Seminis

Ankstyva veislė, vegetacija 57 d. Augalai žemi (50-60 cm), todėl jiems nereikia vytelių. Ankštys 7 cm ilgio su 6-7 žirneliais. Žirneliai vidutinio dydžio, tačiau labai skanūs ir kvapnūs. Atspaumas ligoms: HR: Fop:1 (Fop – Fusarium oxysporum f:sp. Pisi)

Nauja!

SALINERO Seminis

Ankstyviausia žirnių veislė, vegetacija 56 d. (1 d. ankstyvesnė už Avola). Geras deliaus potencialas. Augalo aukštis 60-70 cm, viename mazge suformuoja 1-2 ankštis, žirnelių skaičius ankštyje 7-8. Atsparumas ligoms: HR: BYMV/Fop:1 IR: Pv (MYMV – bean yellow mosaic virus, Fop – Fusarium oxysporum f:sp. Pisi, Pv – Peronospora viciae)

UTRILLO Seminis

Vidutinio ankstyvumo, pagrindinio sezono veislė (Avola + 6 d), labai derlinga žirnių veislė. Ankštys tamsiai žalios, didelės, 12 cm ilgio su 9-10 žirnelių. Augalai 70-80 cm aukščio. Žirneliai labai saldūs. Atsparumas ligoms: HR: BYMV/Ep/Fop:1 (BYMV – bean yellow mosaic virus, Ep – Erypsihe pisi, Fop – Fusarium oxysporum f:sp. Pisi)

MERAVIGLIA DI KELVEDON GALASSI SEMENTI

Labai ankstyva veislė. Ankštis tamsiai žalios spalvos, 8 cm ilgio, joje 7-8 saldūs žirneliai. Ankštys auga po dvi. Augalai 50 cm aukščio. Sėklos raukšlėtos.

PROGRESS 9 SEL. SMERALDO GALASSI SEMENTI

Vidutinio ankstyvumo veislė. Ankštys tamsiai žalios, didelės, 10 cm ilgio su 8-9 žirneliais viduje. Mezga po 1 ankštį viename mazge. Augalai 50 cm aukščio. Atsparūs ligoms. Saldūs.

RONDO SEL SAVIO GALASSI SEMENTI

Ankštys tamsiai žalios, didelės, 11 cm ilgio su 9-10 žirnelių viduje. Auga po 1-2 ankštis viename mazge. Augalo aukštis – apie 80 cm. Atsparūs ligoms.

OSKAR SEMO

Labai ankstyva veislė, vegetacija 69 dienos. Augalo aukštis 65-75 cm. Ankštys - 9 cm ilgio su 10-12 didelių žirnelių.

Nauja!

AMBROSIA semo

Vidutinio ankstyvumo krūminio (nykštukinio) tipo saldžiųjų žirnelių veislė. Šios veislės ankštys yra skanios, saldžios, šviesiai žalios spalvos. Augalai labai derlingi. Ankštys subręsta per 55 dienas nuo sėjos (Centrinės Europos sąlygomis)

Pupelės

AIDAGOLD (šparaginės) semo

Vidutinio ankstyvumo veislė. Lapai nedideli, tamsiai žali, smailėjantys. Ankštys 10-12 cm ilgio, 0,75 cm skersmens, apvalios, geltonos spalvos, blizgančios, be sumedėjusio plaušo. 1000 sėklų sveria 210-250 gr. Sėklos baltos. Augalo aukštis 30-40 cm. Tinka vartoti šviežias, konservavimui, o ypač šaldymui.

BERGGOLD (šparaginės) GALASSI SEMENTI

Ankstyva šparaginių pupelių veislė. Ankštys geltonos, 12-13 cm ilgio, 9 mm pločio, apvalios, tiesios. Augalai 30-40 cm aukščio. Vegetacija - 55 d. Tinka vartoti šviežias, konservuoti.

Nauja!

GAMA (šparaginės) semo

Vidutinio vėlyvumo, labai derlinga šparaginių pupelių veislė (krūminė). Ankštys žalios spalvos, vienodo, 10-12 cm ilgio, 0,7 cm skersmens, sėklos baltos.Tūkstančio sėklų masė 220 g. Augalai vidutiniškai atsparūs antraknozei. Rekomenduojama šviežiam vartojimui ir perdirbimui.

Pupos

Nauja!

SUPERAGUADULCE GALASSI SEMENTI

Vidutinio aknstyvumo pupos, skirtos šiaurės europos klimatui. Augalas apie 65 cm aukščio. Ankštys 8-9 cm ilgio, ankštyje būna 3-5 pupos, priklausomai nuo oro salygų. Pupos didelės ir gero skonio.

Saldieji kukurūzai

LUMINOX F1 semo

Labai ankstyva hibridinė veislė. Vegetacija - 90 dienų. Augalo aukštis – 160-185 cm, burbuolės ilgis 19-20 cm. Puikaus saldaus skonio. Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui.

LONGA F1 semo

Ankstyva hibridinė veislė. Vegetacija - 95 dienos. Augalo aukštis 160-185 cm, burbuolės ilgis 19-20 cm. Augalas užmezga 1-2 burbuoles. Burbuolės didelės, labai saldžios, tiesios, gerai uždengtos lapais, sveria apie 240-310 g., geros prekinės išvaizdos. Tinka vartoti šviežias arba perdirbti. Augalas atsparus ligoms. Rekomenduojama sėti 65 000-70 000 augalų/ha.

RAMONDIA F1 semo

Labai ankstyva hibridinė veislė. Vegetacija – 92 dienos. Augalo aukštis 160-185 cm, burbuolės ilgis 19-20 cm. Kukurūzai dviejų spalvų - 75% geltonos ir 25 % baltos sėklos. Puikaus skonio. Tinka vartoti šviežias arba perdirbti.

Agrimatco

Salotos

Grand rapids tipo

HUGIN Seminis grow forward

Greičiausiai augančios salotos, labai kompaktiškos, lapai storesni, nes turi vaškinį sluoksnį. Auginama visus metus hidroponikoje ir dirvožemyje lauke ir šiltnamyje. Atsparumas ligoms: HR:B1:16-23,25,31,32 IR: LMW:1

PEARL GEM

Greitai augančios, šviesiai žalios spalvos salotos. Atsparios lapų kraštų parudavimui, ilgai išlaiko prekinę išvaizdą. Puikiai tinka auginti šiltnamiuose hidroponinėse sistemose ir atviame grunte.

Batavia tipo

CAIPIRA

Lapinė, nesukanti gūželių, storais šviesiai žalios spalvos lapais, gero skonio salota. Vidutinio dydžio. Tinka šviežiam vartojimui. Tinka auginti šiltnamiuose visus metus, o lauke galima sodinti 10-18 ir 29-33 savaitę. Atsparumas ligoms: Bremia 16-26, 28, 32 rasėms ir salotų mozaikos viruso 1 rasei.

VAIDOSA

Greitai augančios salotos, šiek tiek didesnės ir šviesesnės spalvos nei Caipira salota. Tinka auginti šiltnamiuose visus metus, o lauke galima sodinti visą sezoną. Atsparumas ligoms: Bremia 16-32 rasėms ir salotų mozaikos viruso 1 rase

TUSKA

Tamsiai raudonos spalvos salotos. Salotos didelės, tinka auginti visą sezoną lauke. Salotos atsparios sužydėjimui. Tinka perdirbimui. Atsparumas ligoms: Bremia 1-27 rasėms

Aisbergo salotos

Nauja!

FRILLASTI Seminis grow forward

Frillasti yra kompaktiškos Frillice tipo salotos tamsiai žaliais lapais. Salotos yra labai traškios ir labai skanios. Šios veislės salotos yra trumpesnio augimo ciklo nei ‘Frillice’ (2-3 d.). Augalai atsparūs lapų kraštų parudavimui bei sužydėjimui. Atsparumas: HR: B1-17; IR: LMW 1.

FRILLICE
Aisbergo salota neformuojanti gūžių. Lapai gana stori, vaškinis sluoksnis storas, todėl atsparesnė ligoms. Labai traški ir skani. Tinka auginti dirvožemyje lauke ir šiltnamyje. Atsparumas ligoms: HR: B1-16 IR: LMW 1.

BOOMERANG
Gūželės didelės, minkštais, blizgančiais lapais. Ilgas derliaus nuėmimo periodas. Tinka perdirbimui. Tinka auginti visą sezoną. Atsparumas ligoms: HR: B16-26, 28,31 IR: LMW:1.

EXPRESION
Gūžės vidutinio dydžio, geros kokybės, tinka perdirbimui. Tinka auginti 16-30 savaitę. Gerai auga tiek lengvose, tiek ir sunkiose dirvose, esant vėsiems ir karštiems orams. Atspatumas ligoms: Bremia 1-27 rasėms.

Nauja!

MEDIMO
Vidutinio ankstyvumo aisbergo salotos, skirtos auginti visus metus, pasižyminčios itin geru atsparumu sužydėjimui. Gūžė tvirta, vienodai susukta, vidutinė gūžės masė 450 g. MEDIMO veislės augalai labai atsparūs karščiui, vidutiniškai atsparūs sklerotininiam puviniui, labai atsparūs lapų galiukų parudavimui ir kalcio trūkumui.

Romėnų salotos

MINI XANADU
Salotos banguotais lapais ir traškiu vidumi. Gero skonio, ilgai išlaiko prekinę išvaizdą. Galima auginti visą sezoną, bet gražiausios ir geriausios kokybės būna vasarą. Atsparumas ligoms: Bremia 1-16, 23, 32 rasėms.

Nauja!

FARAMIR
„Triple“ raudonos mini romėninė salotos su žalia šerdele. Tinka auginti lauke pavasario ir rudens derliui, dėl galimo sužydėjimo, esant aukštai temperatūrai. Atsparumas ligoms: Bl:29-36,38-40 Fol:1/ Nr:0/ TBSV

MINI XAROMA
Standartinė mini Romėnų salota, tinka auginti visą sezoną. Salota blizganti, šiek tiek garbanotais kraštais. Atsparumas ligoms: lapų galiukų parudavimui ir Bremia 1-27 rasėms.

CORBANA
Gūžė vidutinio dydžio, 30-32 cm aukščio, kompaktiška, stipriai susukta. Tinka auginti visą sezoną. Galima auginti po priedangomis. Atsparumas ligoms: lapų galiukų parudavimui ir Bremia 1-27 rasėms.

Nauja!

DARK RODEN
Lapinės salotos, tamsios ryškios spalvos. Bowl tipo salotos. Gūžė apie 420 gramų. Skirta pavasario ir dudens derliui

Nauja!

GELBUS
Vidutinio ankstyvumo Romėninė salota. Formuoja 700-800g gūžes. Tinka pasavasio ir rudens derliui. Taip pat tinka auginti „baby leaf” produkcijai. Šios veislės augalai turi didelį atsparumą ligoms.

Sviestinės salotos

Nauja!

BARILLA
Sviestinės salotos, storais, vidutiniškai žaliais lapais. Veislė atspari sužydėjimui, gerai laikosi subrendusi. Puikiai prisitaiko prie įvairių aplinkos sąlygų. Augalai atsparūs lapų kraštelių parudavimui ir miltligei. Užauga per 55 dienas nuo persodinimo.

Nauja!

CHERVANEK
Raudonai žalios spalvos salotos, puikiai tinka auginti lauke pavasarį ir rudenį. Gūžės yra tvirtos ir sunkios (apie 360 g). Augalai labai atsparūs žemai ir aukštai temperatūrai bei sužydėjimui.

Grąžgarstė *(Rucola Selvatica)*

GRAZIA
Augalai ilgais, karpytais, tamsiai žalios spalvos lapais. Vienmetis, apie 30 cm augalas. 1000 sėklų sveria 0,5 g. Sėti galima, kai temperatūra yra apie 0 º C. Lauke sėjama nuo kovo mėnesio iki rugpjūčio pabaigos. Šiltnamyje gali būti sėjamos ištisus metus. Grazia - augalas kompaktiškas.

TRICIA
Greičiausia auganti grąžgarsčių veislė. Lapai vidutiniškai karpyti, statūs. Augalai atsparūs netikrajai miltligei *(Peronospora)* ir vėlai sužydi. Tinka auginti viso sezono metu.

Špinatai

APOLLO F1
Lapai ovalūs iki apvalių, stori, tamsiai žali, šiek tiek raukšlėti. Galima nuimti mažų “baby” lapelių derlių, bet galima auginti didelius lapus. Labai gerai tinka perdirbimui. Pavasario ir rudens derliui. Netinka auginti vasaros metu. Tinka auginti lauke. Atsparumas ligoms: netikrosios miltligės 1-8, 11-14 rasėms.

SOYUZ F1
Lapeliai statūs, gražūs, stori, lygūs, tamsiai žali, kastuvo formos. Labai gerai tinka ”baby” špinatams auginti. Auga lėtai. Gali būti auginami pavasarį, vasarą ir rudenį. Atsparumas ligoms: netikrosios miltligės 1-12, 14 rasėms.

HELIOS F1
Lapai stori, tamsiai žali, ovalūs, truputį smailėjantys, vidutiniškai blizgantys. Tinka auginti vasaros derliui. Vidutiniškai - lėtai augantys špinatai. Atsparumas ligoms: netikrosios miltligės 1-9 ir 11-15 rasėms.

MAGNETIC F1
Rinkos standartus atitinkanti hibridinė veislė, tinkanti auginti beveik visa sezoną, nuo kovo iki rugpjūčio (galima nuimti “baby” lapelių derlių). Lapai vienodi, pusiau garbanoti, gerai išsilaiko. Atsparumas ligoms: netikrosios miltligės 1-15, 17 rasėms.

MIKADO F1
Derlinga hibridinė špinatų veislė. Galima auginti viso sezono metu - ypač vasarą, nes atsparūs sužydėjimui ir aukštai temperatūrai. Lapai tamsiai žali, smailūs, ilgais rusvais stiebeliais. Atsparumas ligoms: netikrosios miltligės 1-12, 13 rasėms.

Krapai

LENA
Derlina žemaūgė veislė. Labai tamsiai žalios spalvos, labai kvapnūs. Augalai 25-30 cm aukščio, statūs, stipriai šakojasi, ilgai nesužydi. Tinkami auginimui vazonėliuose, šiltnamyje – pavasario ir rudens derliui, lauke – visa sezoną.

HERA
Ilgai žiedynų neformuojanti veislė. Augalas status, užaugina daug žalios masės. Tinka vartoti šviežius ir perdirbimui. Rekomenduojama auginti vasaros metu, nes ilgai neformuoja žiedynų, net esant aukštoms temperatūroms.

THALIA
Tinka auginti visą sezoną, ypač rekomenduojama auginti vasaros metu, nes ilgai neformuoja žiedynų, net esant aukštoms temperatūroms. Tinka vartoti šviežius ir perdirbimui. Tamsiai žalios spalvos, labai tvirtu stiebu. Derlingi.

DIANA
Derlinga, pusiau krūminė krapų veislė. Lapija tamsiai žalios spalvos, stati, vešli. Tinka vartoti šviežius ir perdirbimui. Rekomenduojama auginti pavasario ir rudens derliui, nes auga greičiau už kitas veisles.

DUKAT
Derlinga, tamsiai žalios spalvos, formuojanti kompaktišką krūmelį veislė. Ilgai neformuoja žiedų. Labai aromatingi, turi daug eterinių aliejų. Tinka džiovinimui, šaldymui.

KARAT
Augalai formuoja kompaktišką krūmelį. Labai aromatingi. Tinka džiovinimui, šaldymui.

COMPACT
Augalai labai kompaktiški, tinkami auginti vazonėliuose, balkone ir lauke. Lapija tamsiai žalia.

HANAK
Lapija ryškiai žalia, kvapni. Po 35-40 d. nuo sėjos galima nuimti žalios masės derlių. Tinka augintini lauke ir šiltnamyje. Vegetacija iki pilnos brandos, kai subręsta sėklos, yra 70 dienų. Augalas užauga iki 80-100 cm aukščio.

Petražolės

KADERAVA
Lapinės petražolės, Mooskrause tipo tamsiai žaliais, garbanotais lapais veislė. Derlinga. Lapija traški, aromatinga, trumpais koteliais. Nupjauta greitai atželia. Pirmą derlių galima pradėti imti po 90 dienų.

GIGANTE D'ITALIJA
Greitai auganti, aromatinga lapinių petražolių veislė. Lapeliai lygūs, platūs, tamsiai žalios spalvos. Labai derlinga. Tinka vartoti šviežias ir perdirbimui. Galima auginti lauke ir vazonėliuose.

ORBIS Šakninės petražolės
Vidutinio ankstyvumo, derlinga šakninių petražolių veislė. Vegetacija 182 d. (nuo sėjos iki derliaus nuėmimo). Šakniavaisiai 20-22 cm ilgio, sveiki. Puikiai sandėliuojasi. Tinka auginti ir sunkiose dirvose.

Kalendra

AROMA
Aromatingi, blizgančiais lapais augalai. Ilgai nesužydi, "Long Standing" tipo

Bazilikas

MARIAN
Genovese tipo bazilikų veislė. Tinka auginti tik vazonėliuose šiltnamyje. Lapeliai tamsiai žalios spalvos, vidutinio dydžio. Atsparūs lapų galiukų parudavimui, lapeliai tvirtesni, todėl mažiau pažeidžiam pakavimo metu. Toleruoja vėsesnį orą.

RED RUBIN
Lapeliai intensyvios rubino spalvos, puikaus aromato. Greitai auga. Tinka auginti vazonėliuose šiltnamyje.

UAB „AGRIMATCO VILNIUS“

S. Lozoraičio g. 19A, LT-53228,
Garliava, Kauno raj., Lietuva

Tel.: (8-37) 55 21 72
agrimatco.lithuania@agrimatco-eu.com

www.agrimatco.lt

Agrimatco Lietuva

agrimatcolietuva

Agronomė - konsultantė

+370 674 67979
audrone.zebrauskiene@agrimatco-eu.com

Pardavimų vadybininkė

+370 647 64644
karolina.kazlauskaite@agrimatco-eu.com

Biostimuliantai

KELPAK savybės: pagerina daigų prigijimą, skatina šaknų masės augimą:

- sumažina abiotinio bei biotinio streso pasekmes;
- skatina fotosintezę bei medžiagų apykaitos procesus;
- pagerina žiedadulkių daigumą bei žiedų vaisingumą bei vaisių formavimąsi,
- didina augalų derlių ir gerina kokybę.