



agrimatco

BROTAVERD

MIKROELEMENTŲ MIŠINYS: VARIS (Cu), MANGANAS (Mn) IR CINKAS (Zn)

Skystos kompleksinės lapų trąšos, kurių sudėtyje esantys varis (Cu), manganas (Mn) ir cinkas (Zn) pašalina šių elementų trūkumą augaluose. Kartu su mikroelementais esanti lignosulfatinė rūgštis pagerina augalų lapų, šaknų ir vaisių augimą.

Privalumai:

- Didina sulčių judėjimą augale;
- Gerina augalų mitybą;
- Storina augalo sieneses;
- Pagreitina augalo dalių regeneraciją.

| SUDĖTIS | MASĖ, % | G/L |
|-------------------------------|------------------------|-----|
| Varis (Cu) | 1,80% | 18 |
| Manganas (Mn) | 0,80% | 8 |
| Cinkas (Zn) | 0,50% | 5 |
| Paviršiaus aktyvioji medžiaga | lignosulfatinė rūgštis | |
| pH | 2,7 | |

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

| TRĘŠIMAS PER LAPUS | NORMA | PANAUDOJIMAS |
|-------------------------------|--------------|---|
| Javai, rapsai, žirniai, pupos | 0,4–1,0 l/ha | Javuose iki krūmijimosi. Rapsuose, žirniuose – stiebo augimo metu. |
| Bulvės | 0,4–1,0 l/ha | Bulvės iki žydėjimo ir kai formuojasi gumbai. |
| Šakniavaisiai | 0,4–1,0 l/ha | Kai prasideda šakniavaisių formavimasis. |
| Svogūnai | 0,4–1,0 l/ha | Luobelės formavimosi tarpsnyje. |
| Pomidorai, agurkai, paprikos | 0,4–1,0 l/ha | Kai pastebimas maisto medžiagų trūkumas ar norime atgaivinti augalus. |
| Uogynai ir sodai | 2,0 l/ha | Lapų ir vaisių augimo suaktyvinimui. |
| PER LAISTYMO SISTEMAS | NORMA | PANAUDOJIMAS |
| Visi augalai | 3,0–5,0 l/ha | Profilaktiškai ir esant matomiems trūkumams. |

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Brotaverd veikia labiau sistemiškai – jis naudojamas tiek per lapus, tiek per šaknis. Rekomenduojama naudoti augalų augimo tarpsnių keitimosi metu. Minimalus naudotinas vandens kiekis 200 l/ha. Augalai produkto naudojimo metu turi būti sudrėkinti.

Jo naudojimas prasidėjus augalo brendimui kai kuriais atvejais gali sukelti žalėjimą.