



agrimatco

Basfoliar® Avant Natur SL

Organinės-mineralinės skystosios N trąšos 5-0-0 su augalinės kilmės aminorūgštimis
Trąšų sudėtyje yra augalinės kilmės amino rūgštys. Pagrindinės šių trąšų savybės:

- padidina augalų atsparumą stresui
- aprūpina augalus baltymų sintezei reikalingomis medžiagomis
- skatina augalų žydėjimą ir apvaisinimą - didina derlių
- mažina neigiamą ligų įtaką augalams
- pagerina derliaus kokybę (baltymų kiekį)

SUDĖTIS	PAGAL TŪRĮ
Suminis azotas (N)	5,5%
Amoniakinis azotas (N-NH ₄)	2,5%
Organinis azotas (N org)	3,0%
Laisvosios amino rūgštys	10,3%
pH (20°C)	5
Tankis (20°C)	1130 g/l

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PURŠKIMŲ SKAIČIUS	PANAUDOJIMAS
Kukurūzai	2 l/ha	2	nuo 5 lapelių stadijos, po to pakartoti po 14 dienų
Rapsai	2 l/ha	2	prieš ir po žydėjimo
Cukriniai runkeliai	2 l/ha	2	po sudygimo, prieš uždengiant eiles
Bulvės ir daržovės	2 - 3 l/ha	2-3	po sudygimo, vėliau kas 14 dienų
Javai	2 l/ha	2	nuo vegetacijos pradžios pavasarį, prieš žydėjimą
Vaismedžiai ir vaiskrūmiai	2 - 3 l/ha	3-4	po žydėjimo iki vaisių spalvinimo pradžios, 8-14 dienų po pasodinimo, prieš ir po žydėjimo
Braškės,	2 - 3 l/ha	1-2	nuo žydėjimo iki vaisių formavimosi
Mėlynės	2 - 3 l/ha	2-3	prieš ir po žydėjimo
Pomidorai, paprika	2 - 3 l/ha	3-4	kol vaisiai įgaus spalvą
Svogūnai, porai, česnakai	2 - 3 l/ha	kelis kartus	kelis kartus per vegetaciją
Dekoratyviniai augalai	0,2-0,3% tirpalas	kelis kartus	kelis kartus per vegetaciją, kas 10-14 dienų
Šiltnaminės daržovės (pomidorai, agurkai, paprika)	Tręšimui: 10-15 l/ha kas 14 dienų.		prieš žydėjimą, intensyvaus vaisiaus augimo fazėje
Dekoratyviniai augalai	Tręšimui: 10-15 l/ha kas 14 dienų.		prieš ir po žydėjimo

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Rekomenduojama prieš maišant su kitais preparatais, patikrinti suderinamumą mažam kiekiui tirpalo. Darbinis tirpalas ruošiamas, naudojant 300-500 l/ha švaraus vandens. Trąšos supilamos į purkštuvą tolygiai, nedideliais kiekiais, nuolat maišant.