



agrimatco

Boramide Plus

Tai skystos boro trąšos su molibdenu. Dėl ypatingos formos boras lengvai įsisavinamas augalų audiniuose (pasižymi dideliu judrumu ir biologiniu veiksmingumu). **BORAMIDE PLUS** gerina žiedadulkių vaisingumą ir skatina didesnę angliavandenių bei lipidų kaupimąsi augaluose.

SUDĖTIS	PAGAL MASĘ %	PAGAL TŪRĮ %
Vandenyje tirpus boras (B), iš etanolamino	11	15
Vandenyje tirpus molibdenas (Mo), iš natrio	0,02	0,027
pH (20°C)	7,0-8,0	
Tankis (20°C)	1350-1370 g/l	

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMAS
Javai, kukurūzai	1 – 2 l/ha	Kelis kartus intensyvaus augimo metu
Cukriniai runkeliai, rapsai	2 – 4 l/ha	Kelis kartus intensyvaus augimo metu
Daržovės, dekoratyviniai augalai	2 – 4 l/ha	Kelis kartus intensyvaus augimo metu

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:

Rekomenduojama prieš maišant su kitais preparatais, patikrinti suderinamumą mažam kiekiui tirpalo. Darbinis tirpalas ruošiamas, naudojant 300-500 l/ha švaraus vandens. Trąšos supilamos į purkštuvą tolygiai, nedideliais kiekiais, nuolat maišant.

Normos rekomendacinės – būtina atsižvelgti į augalų būklę ir aplinkos sąlygas!