



agrimatco

Chelastar Fe

VANDENYJE TIRPUS GELEŽIES EDTA CHELATAS

Chelastar Fe – efektyvus ir visiškai vandenyje tirpus geležies EDTA chelatas, kompensuojantis jos trūkumą. Gali būti naudojamas purškiant ant lapų, tręšiant tiesiai į dirvą ar per laistymo sistemas. Tai geriausia priemonė, siekiant įveikti augalų geležies trūkumą.

SUDĖTIS

Pagrindinės charakteristikos:	masė, %
Geležis (Fe) 100% EDTA	13,2

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

LAISTYMAS SU HIDROPONIKA	NORMA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Visi laistymo augalai	0,4–0,6 kg / 1000 L vandens	2 kartus prasidėjus vegetacijai.
Vaismedžiai, braškės, daržovės	4,0–8,0 kg/ha	Visos vegetacijos metu dalimis, kas 2 savaitės.
Gėlės, dekoratyviniai augalai	1 nubrauktas arb. šaukštelis / 10 L vandens	Tręšti 2–3 kartus kas 7–10 dienų arba pasirodžius geležies trūkumo požymiams.
TRĘŠTI Į DIRVĄ	NORMA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Visi geležies trūkumui jautrūs augalai	4,0–8,0 kg/ha	Tręšti prieš sėją, persodinimą ar vegetacijos pradžioje.
Braškės	5,0–10,0 kg/ha	Tręšti prieš persodinimą arba vegetacijos pradžioje.
PURKŠTI ANT LAPŲ	NORMA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Visi geležies trūkumui jautrūs augalai	1,0–2,0 kg/ha	Purkšti, kai ant lapų pasirodo geležies trūkumo požymių.
Daržovės	2–5 g/m ²	Purkšti, kai yra pakankamai lapijos.
Vaismedžiai	30–100 g / 100 L vandens	Purkšti prieš žydėjimą ir vaisių mezgimosi metu.
Dekoratyviniai augalai	30–100 g / 100 L vandens	Purkšti 2–4 kartus kas 7–10 dienų nuo vegetacijos pradžios.
Vynuogės	1–2 kg/ha	Purkšti 2 kartus prieš žydėjimą ir 2 kartus po žydėjimo.

PASTABOS

Purškiant ant lapų, vieno purškimo metu neviršyti 100 g/100 litrų vandens.