



agrimatco

Foliq Bor

FoliQ® BOR yra lengvai naudojamos ir lengvai dozuojamos skystos boro trąšos, skirtos naudoti augalams, kuriems reikalingas didelis boro kiekis (pvz., cukriniams runkeliams, rapsams, daržovėms, morkoms, salierams, sodams). Didelis boro kiekis lengvai įsisavintoje formulėje padeda laiku ir patikimai pašalinti latentinį ir akivaizdų boro trūkumą.

SUDĖTIS	PAGAL MASEĮ %	KIEKIS G/L
Boras (B) kaip boro rūgštis visiškai tirpus vandenyje	11%	150 g/l
pH	7,0-8,0	
Tankis	1,34 kg/l	

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMAS
Kultūra	Norma l/ha	Purškimo laikas
Sėklavaisiai ir kaulavaisiai	1-2 l/ha	Purškšti 3 kartus: 1) Žaliųjų pumpurų stadijoje 2) Žiedlapių kritimo stadijoje 3) Nuėmus derlių
Braškės	2 l/ha	1 kartą prieš pat žydėjimą
Rapsai, cukriniai runkeliai	1,0-1,5 l/ha	2-3 kartus per sezoną
Kukurūzai, bulvės	1,0-1,5 l/ha	2-3 kartus per sezoną
Kopūstinės daržovės, morkos	1,0-1,5 l/ha	2-3 kartus nuo gūžių formavimo pradžios

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

FoliQ® BOR galima maišyti su dauguma augalų apsaugos priemonių. Prieš naudojimą suplakti!