



agrimatco

Foliq Calmax

Foliq® Calmax yra koncentruotos trąšos, rekomenduojamos naudoti siekiant pagerinti pasėlių aprūpinimą kalciumu. Ši formulė pasižymi dideliu kalcio kiekiu, kurį augalai lengvai pasisavina.

Purškiant per lapus:

- Prevenciškai apsaugo arba atstato kalcio trūkumą augaluose
- Sumažina vaisių ar uogų kritimą
- Kalcis skatina ląstelių dalijimąsi, todėl vaisiai tampa tvirtesni
- Padeda augalams apsisaugoti nuo vandens, karščio ir per didelio druskų kiekio sukkelto streso
- Pagerina vaisių kokybę ir jų išsilaikymą

SUDĖTIS	PAGAL MASEĮ %	KIEKIS G/L
Suminis azotas (N)	10	150 g/l
Nitratinis azotas (NO ₃)	9,1	150 g/l
Amidinis azotas (NH ₂)	0,9	150 g/l
Kalcio oksidas (CaO)	15	225 g/l
Magnio oksidas (MgO)	2	30 g/l
Boras (B) rūgšties pavidalu	0,07	1,1 g/l
Varis (Cu) EDTA	0,03	0,5 g/l
Geležis (Fe) EDTA	0,03	0,5 g/l
Manganas (Mn) EDTA	0,1	1,5 g/l
Molibdenas (Mo) natrio molibdato pavidalu	0,001	0,02 g/l
Cinkas (Zn) EDTA	0,02	0,3 g/l

TRĖŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Obelys, kriaušės	2-5	1-4 kartus pumpurų ir vaisių augimo laikotarpiu
Kaulavaisiai	3-6	3-4 kartus nuo vaisiaus formavimosi pradžios
Persikai	3-6	3-4 kartus nuo vaisių formavimosi pradžios
Braškės	3-6 (max 3%)	2-3 kartus nuo vaisiaus formavimosi pradžios
Salotos, cikorijos	4-5	2-3 kartus nuo antros savaitės po pasodinimo
Pomidorai, paprika, agurkai	4-5 (0,1% po priedanga)	2-3 kartus nuo vaisiaus formavimosi pradžios
Kopūstinės daržovės	4-5	2-3 kartus nuo gūžių formavimo pradžios
Kitos lauko daržovės	4-5	2-3 kartus intensyvaus augimo metu

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Foliq® Calmax galima maišyti su dauguma augalų apsaugos produktų.