



agrimatco

Foliq Optephos

PAPRASTOSIOS SKYSTOSIOS NEORGANINĖSMAKROELEMENTŲ NPK TRĄŠOS 5-20-0

SUDĖTIS	PAGAL MASĖ %	KIEKIS G/L
Suminis azotas (N)	5%	60,5 g/l
Amidinis azotas (NH ₄ -N)	5%	60,5 g/l
Suminis fosforo pentoksidas (P ₂ O ₅) (= 8,75% P)	20%	242 g/l
Fosforo pentoksidas (P ₂ O ₅) visiškai tirpus vandenyje	20%	242 g/l
Fosforo pentoksidas (P ₂ O ₅) tirpus neutraliame amonio citrato tirpale	20%	242 g/l
pH	7,0-8,0	
Tankis	1,34 kg/l	

TRĘŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA L/HA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Javai	2-3 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Rudeni – nuo 3 lapelių stadijos iki likus dviem savaitėm iki rudens vegetacijos pabaigos. Pavasari – nuo augimo pradžios iki varpu formavimosi.
Rapsai	2-3 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Rudeni – nuo 3 lapelių stadijos iki likus dviem savaitėm iki rudens vegetacijos pabaigos. Pavasari – nuo augimo pradžios iki žydėjimo pradžios.
Kukurūzai	2-3 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Nuo 4 lapelių stadijos iki aukščio, kai Techniškai įmanoma apdoroti.
Burokėliai	2-3 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Nuo 4-6 lapelių stadijos iki eilutes uždengiamos lapais.
Bulvės	3 l/ha	2-3 kartus Nuo daigų formavimosi iki pasiekama 40% galutines gumbų mases.
Ankštiniai augalai	2-3 l/ha	1-2 kartus per sezoną. Nuo aiškaus sudygimo iki žydėjimo stadijos.
Pievos	2-3 l/ha	1-2 kartus per sezoną. Nuo augimo pradžios; po kiekvieno pjovimo ar ganymo apdoroti kas 7-10 dienų.
Vaismedžiai	3-5 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Augimo pradžioje, po žydėjimo, vaisių formavimosi metu ir prieš derlių, siekiant pagerinti vaisių spalvą.
Uogos	3-5 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Intensyvaus augimo metu, ypač pavasari, po žydėjimo ir prieš vaisiams pradendant keisti spalvą.
Lauko daržovės	3-5 l/ha	2-3 kartus per sezoną. Nuo 4-6 lapelių stadijos arba po persodinimo, ypač intensyvaus augimo ir nepalankių klimato sąlygų metu.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

NENAUDOTI ekstremaliomis oro sąlygomis arba kai tokios sąlygos prognozuojamos, pvz., karšta saule, šalna ar sausra.

NENAUDOTI kultūroms auginamoms po stiklu arba plėvele.