



agrimatco

## Prima Mn Zn Cu

### SUDĖTINĖS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS

Skystos Mangano (Mn) trąšos, skirtos papildomam tręšimui, praturtintos cinku (Zn) ir variu (Cu). Manganas įeina į daugelio fermentų sudėtį ir dalyvauja vykstant oksidacijos ir redukcijos reakcijoms, fotosintezei, angliavandenių ir azoto mainų procesams. Varis - dalyvauja baltymų ir angliavandenių apykaitoje, formuoja ligniną – struktūrinį ląstelių stiprumo elementą, to pasėkoje didėja atsparumas grybinėms ir bakterinėms ligoms. Varis yra fotosintezės ir kvėpavimo procesų katalizatorius. Cinkas - įeina į daugelio fermentų sudėtį ir dalyvauja vykstant įvairiems energijos ir maisto medžiagų apykaitos procesams. Cinkas labai svarbus pradžioje vegetacijos - jis daro įtaką produktyvių stiebų formavimuisi, jų tvirtumui ir grūdų mezgimuisi.

SUDĖTIS	PAGAL MASEĮ %	KIEKIS G/L
Suminis azotas (N)	7,0%	100 g/l
Nitratinis azotas (NO <sub>3</sub> )	7,0%	100 g/l
Varis (Cu)	2,0	30 g/l
Manganas (Mn)	8,6	130 g/l
Cinkas (Zn)	4,7	70 g/l

### TRĖŠIMO REKOMENDACIJOS

KULTŪROS	NORMA	PANAUDOJIMO LAIKAS
Javai	0,5-1,0 l/ha	Purškimai: I-BBCH 10-19; II-BBCH 21-35
Rapsai		Purškimai: I-BBCH 10-18; II-BBCH 25-51
Pupiniai (pupos, žirniai, sojos)		Purškimai: I-3-5 lapai; II-butonizacijos pradžia
Runkeliai		Purškimas suformavus 50% lapų
Kukurūzai		Purškimai: I-2-4 lapai; II-4-6 lapai
Bulvės	0,25-0,5 l/100 l vandens	Purškimai: I-lapų ir stiebų augimas, II-gumbų formavimas, III-žydėjimas, IV-brendimas
Daržovės	0,25-0,5 l/100 l vandens / laistymas 0,2-0,5%	Purškiamą/laistoma butonizacijos, žydėjimo pradžioje arba šakniavaisio formavimo ir augimo tarpsniuose, 3-5 kartus, kas 7-10 dienų
Uogakrūmiai		Purškiamą/laistoma uogų mezgimo ir derėjimo metu, 4-6 kartus, kas 5-7 dienas
Sodo augalai		Purškiamą/laistoma vaisių užuomazgų formavimo metu 1-2 kartus
Dekoratyviniai augalai ir daigai		Purkšti/laistyti rudeni, kad augalai geriau peržiemotų ir žydėjimo metu, kas 7-10 dienų

### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Prima Mn Zn Cu gali būti naudojamas mišiniuose su daugybe trąšų ir pesticidų (insekticidų, fungicidų). Nenaudokite su produktais, kuriuose yra daug vario (Cu), sieros (S) ir mineralinių alyvų. Prieš maišant rekomenduojama paruošti nedidelį kiekį mišinio, kad patikrintumėte, ar nėra nuosėdų. Norint patikrinti, ar augalams nėra fitotoksinio poveikio, rekomenduojama purkšti nedideliame plote.